12

INSTRUCTIONS FOR USE (IFU)

GC Tooth Mousse™

Last revised: 04/2018 7330418

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

GC Tooth Mousse™

TOPICAL CREME WITH BIO-AVAILABLE CALCIUM AND PHOSPHATE

For use by or under the supervision of a dental professional in the recommended indications.

Description
GC Tooth Mousse is a water based creme containing RECALDENT™ (CPP-ACP: Casein Phosphopeptide - Amorphous Calcium Phosphate). When CPP-ACP is applied in the oral environment, it will bind to biofilm, plaque, bacteria, hydroxyapatite and soft tissue localising bio-available calcium and phosphate.

Important:
Saliva will enhance the effectiveness of CPP-ACP and the flavour will fade stimulate saliva flow. The longer CPP-ACP and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.

A topical paste containing bio-available calcium and phosphate
1. Provides extra protection for teeth;
2. Helps neutralize acid challenges from acidogenic bacteria in plaque,
3. Helps neutralize acid challenges from other internal and external acid sources.

CONTRAINDICATIONS
RECALDENT™ (CPP-ACP) is derived from milk casein. Do not use this material on patients with a proven or suspected milk protein allergy and/or with a sensitivity or allergy to benzoate preservatives.

DIRECTIONS FOR USE
INDICATIONS
a. Prior to and following in-office bleaching.
b. After ultrasonic, hand scaling or root planing.
c. Following professional tooth cleaning (PTC).
d. After application of topical fluoride.
e. To provide a topical coating for patients suffering from erosion, xerostomia or Sjögrens syndrome.
f. During orthodontic treatment.
g. For high risk caries patients.
h. For special needs patients.

In-office application:
I. Custom tray application
1. Before use rinse the custom tray thoroughly under running water.
2. Extrude a generous layer of GC Tooth Mousse into the tray and apply to the upper and / or lower teeth.
3. Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
4. Remove the tray.
5. Instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Instruct the patient to refrain from eating for as long as possible (1 - 2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
6. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

II. Non tray application:
1. If necessary, remove any excess saliva on the tooth surface with a cotton roll or pellet. However, it is NOT necessary to dry the teeth with compressed air.
2. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to the tooth surfaces using an application swab, gloved finger or in difficult interproximal areas using an Interproximal Tooth Cleaning Brush.
3. Leave GC Tooth Mousse undisturbed for a minimum of 3 minutes.
4. Then instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Request the patient to hold in the mouth for as long as possible (additional 1 - 2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
5. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

At home application:
III. Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional
1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 - 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate overnight. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

IV. Night time application after tooth brushing as recommended by a dental professional
1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 - 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate overnight. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

FLAVORS
Strawberry, Melon, Vanilla, Mint, Tutti-Frutti
STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool dry low humidity area away from sunlight (5-25°C) (40,4-77,0°F).
PACKAGES
Tube containing 40g (35mL)
1. Assorted Package
10 x 40g (2 each of Strawberry, Melon, Vanilla, Mint, Tutti-Frutti)
2. Single Flavor Package
10 x 40g in each flavor Vanilla, Strawberry, Melon**, Tutti-Frutti**, Mint
**available in Europe only
3. Refill Package
1 x 40g tube in each flavor
NOTE
GC Tooth Mousse with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia.
*RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada, and USA.
CAUTION
1. Always replace cap after use and remove any residual paste or moisture around the tube neck or inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product such as a flavoring agent. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the Safety Data Sheets available at http://www.gceurope.com/
They can also be obtained from your supplier.

Last revised : 04/2018

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900
opinfo@gcamerica.com
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900
GC CORPORATION
15-4 Hakusan 4-chi, Bunkyo-ku, Tokyo 1146569, Japan
EU: GC EUROPE N.V.
Head office: Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven, Belgium
TEL: +32 16 74 10 00
GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
11 Tampines Concourse, #03-05 Singapore 528729
TEL: +65 6508 7288
GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.
1/50 Botany Rd, Bankstown Nsw, NSW 2216, Australia
TEL: +61 2 9351 9288
PRINTED IN THE USA

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen! DE

GC Tooth Mousse™

CREME MIT BIOVERFÜGBAREM KALZIUM UND PHOSPHAT

Zur Anwendung durch oder unter der Kontrolle durch zahnmedizinisches Fachpersonal für die angegebenen Indikationen.

BESCHREIBUNG
GC Tooth Mousse ist eine wasserbasierte Creme, die RECALDENT™ (ein CPP-ACP: Casein Phosphopeptide-Amorphes Calcium Phosphat) enthält. Bei der Anwendung von CPP-ACP kommt es zu einer Bindung an Plaque, Biofilmen, Bakterien, Hydroxylapatiten und Weichgewebe an und gibt bioverfügbares Calcium und Phosphat ab.

WICHTIG
Durch Speichel wird die Wirkung der CPP-ACP erhöht; der Geschmack fördert die Speichelbildung. Je länger CPP-ACP und der Speichel im Mund verbleiben, um so besser wird das Ergebnis.

GC Tooth Mousse ist eine neue Crème, die bioverfügbares Calcium und Phosphate enthält, und somit
1. einen Extra-Schutz für die Zähne erzeugt,
2. dabei hilft, Säuren von säurebildenden Bakterien in Plaque zu neutralisieren.
3. bei der Neutralisation von anderen Säuren im Mund unterstützt.

GEGENANZEIGEN
RECALDENT™ (CPP-ACP) ist ein Milch-Kasein-Derivat. GC Tooth Mousse nicht bei Patienten mit Milcheiweissallergie oder einer Allergie / Sensibilisierung auf benzoathaltige Konservierungsmittel anwenden.

VERWENDUNG
INDIKATIONEN
a. Vor und nach dem Bleaching in der Praxis.
b. Nach Ultraschall- oder manueller Zahnreinigung und nach Zahnsteinbehandlungen.
c. Nach der professionellen Zahnreinigung (PZR).
d. Nach der Anwendung von äußerlichem Fluor.
e. Als Oberflächenschutz für Patienten, bei denen Erosionen, Xerostomia oder Sjögren's Syndrom auftreten.
f. Während einer kieferorthopädischen Behandlung.
g. Bei hohem Kariesrisiko.
h. Für Patienten mit speziellen Bedürfnissen.

Praxisanwendung:
I. Anwendung mit individuellem Löffel
1. Nach dem Bleichen des individuellen Löffel unter fließendem Wasser reinigen.
2. Eine großzügige Portion GC Tooth Mousse in den Löffel geben und diesen auf den Ober- und / oder Unterkiefer applizieren.
3. Den Löffel für mindestens 3 Minuten ganz ruhig im Munde des Patienten lassen.
4. Den Löffel entfernen.
5. Den Patienten anweisen, mit der Zunge die übriggebliebenen GC Tooth Mousse im Mund zu verteilen. Der Patient soll solange wie möglich (mind. 1-2 Minuten) die Paste im Mund behalten, ohne diesen dabei zu irritieren oder zu verschlucken, so länger GC Tooth Mousse und der Speichel im Mund verbleiben, um so besser wird der Behandlungserfolg.
6. Reste vorsichtig ausspucken, dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Eventuell zurückbleibendes GC Tooth Mousse lässt sich schrittweise selber auf. Der Patient soll frühestens 30 Minuten nach der Behandlung wieder essen oder Trinken.

II. Anwendung ohne Löffel
1. Wenn nötig, überschüssigen Speichel von den Zahnoberflächen abtupfen; es braucht jedoch nicht mit Druckluft getrocknet zu werden.
2. Eine ausreichende Menge GC Tooth Mousse mit einem Tupfer, Handschuh oder in schwierigen interproximalen Situationen einer Interproximalbürste auf der Zahnoberfläche verteilen.
3. GC Tooth Mousse für mindestens 3 Minuten ganz ruhig im Munde des Patienten lassen.
4. Den Patienten anweisen, mit der Zunge die übriggebliebenen GC Tooth Mousse im Mund zu verteilen. Der Patient soll solange wie möglich (mind. 1-2 Minuten) den Schaum im Mund behalten, ohne diesen dabei zu inhalieren oder zu verschlucken, so länger GC Tooth Mousse und der Speichel im Mund verbleiben, um so besser wird der Behandlungserfolg.
5. Reste vorsichtig ausspucken, dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Eventuell zurückbleibendes GC Tooth Mousse lässt sich schrittweise selber auf. Der Patient soll frühestens 30 Minuten nach der Behandlung wieder essen oder Trinken.

Heimanwendung:
III. Tägliche Anwendung nach dem Zähneputzen, wie vom zahnmedizinischen Fachpersonal empfohlen
1. Eine ausreichende, mind. Bohnengroße Menge an GC Tooth Mousse jeweils auf Ober- und Unterkiefer auftragen. Mit einem sauberen Finger oder einem Wattestäbchen verteilen, in schwierigen approximalen Bereichen mit einer Approximalbürste oder Zahnseide auftragen.
2. GC Tooth Mousse mindestens drei Minuten lang ungestört auf den Zahnoberflächen belassen.
3. Anschließend das verbliebene GC Tooth Mousse mit der Zunge im Mund verteilen; solange wie möglich in der Mundhöhle behalten (mind. 1-2 Minuten); dabei Ausspucken oder Verschlucken vermeiden, so länger GC Tooth Mousse und Speichel einwirken können, um so besser die Wirkung.
4. Reste vorsichtig ausspucken, dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Reste von GC Tooth Mousse können problemlos über Nacht in der Mundhöhle verbleiben. Nach der Anwendung 30 Minuten nicht essen oder trinken.

IV. Anwendung am Abend / in der Nacht nach dem Zähneputzen, wie vom zahnmedizinischen Fachpersonal empfohlen
1. Eine ausreichende, mind. Bohnengroße Menge an GC Tooth Mousse jeweils auf Ober- und Unterkiefer auftragen. Mit einem sauberen Finger oder einem Wattestäbchen verteilen, in schwierigen approximalen Bereichen mit einer Approximalbürste oder Zahnseide auftragen.
2. GC Tooth Mousse mindestens drei Minuten lang ungestört auf den Zahnoberflächen belassen.
3. Anschließend das verbliebene GC Tooth Mousse mit der Zunge im Mund verteilen; solange wie möglich in der Mundhöhle behalten (mind. 1-2 Minuten); dabei Ausspucken oder Verschlucken vermeiden, so länger GC Tooth Mousse und Speichel einwirken können, um so besser die Wirkung.
4. Reste vorsichtig ausspucken, dabei Spülen wenn möglich vermeiden. Reste von GC Tooth Mousse können problemlos über Nacht in der Mundhöhle verbleiben. Nach der Anwendung 30 Minuten nicht essen oder trinken.

GESCHMACKSRICHTUNGEN
Erdbeere, Melone, Vanille, Minze, Tutti-Frutti
AUFBEWAHRUNG
Empfehlung für die optimalen Eigenschaften, an einem kühlen und trockenen Ort, geschützt vor direktem Sonnenlicht (5-25°C; 40,4-77,0°F).
PACKUNGSGRÖSSEN
Tubeninhalt jeweils 40g (35mL)
1. Sortimentspackung
10 x 40g jeweils zweimal Erdbeer, Vanille, Melone, Minze, und Tutti-Frutti
2. Packung mit je einer Geschmacksrichtung
10 x 40g der jew. Geschmacksrichtung Vanille, Erdbeere, Melone**, Tutti-Frutti**, Minze
** Nur in Europa erhältlich
3. Nachfüllpackung
1 x 40g Tube in jeder Geschmacksrichtung
ANMERKUNG
GC Tooth Mousse mit seiner speziellen CPP-ACP Formulierung wurde an The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australien entwickelt.
*RECALDENT ist ein Warenzeichen unter Lizenz. Auf die CPP-ACP - Technologie sind Patente erteilt oder angemeldet in Australien, Neuseeland, Europa, Kanada und den USA.
VORSICHT
1. Die Tube immer sofort nach Gebrauch verschließen; Pastenreste oder Feuchtigkeit am Tubenhals oder in der Kappe entfernen.
2. Bei Augenkontakt sofort mit Reichlich Wasser spülen und medizinische Hilfe aufsuchen.
3. Spritzer auf der Bekleidung können mit Wasser abgewaschen werden.
4. Bei Auftreten von Symptomen eines Angioödems, das auf die Konservierungsstoffe oder einen Inhaltsstoffe von GC Tooth Mousse zurückgeführt werden könnte, ist die Behandlung sofort abzubrechen und der Patienten an einen Mediziner zu verweisen.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind:
http://www.gceurope.com/

Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

Zuletzt aktualisiert : 04/2018

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi. FR

GC Tooth Mousse™

CRÈME AU CALCIUM ET PHOSPHATE BIO-DISPONIBLES POUR APPLICATION TOPIQUE

Utilisation sous la totalité d'un professionnel dentaire et selon les recommandations d'utilisation.

DESCRIPTION
GC Tooth Mousse est une crème à base d'eau contenant du RECALDENT™ (CPP-ACP: Phosphopeptine Caséine-Phosphate de calcium amorphe). Lorsque le CPP-ACP est appliqué en bouche, il va se lier aux biofilms, à la plaque dentaire, aux bactéries, à l'hydroxyapatite et aux tissus mous localisant le calcium et le phosphate bio-disponibles.

IMPORTANT
La salive va améliorer l'efficacité du CPP-ACP et le goût s'estomper le flux salivaire. Plus le CPP-ACP et la salive sont maintenus en bouche, plus le résultat sera efficace.

Une pâte topique contenant calcium et phosphate bio disponibles :
1. Procure une meilleure protection des dents.
2. Aide à neutraliser les attaques acides des bactéries de la plaque dentaire.
3. Aide à neutraliser les attaques acides d'autres origines internes ou externes.

CONTRE-INDICATIONS
RECALDENT™ (CPP-ACP) est un dérivé de la caséine du lait. Ne pas utiliser chez des patients allergiques ou présentant une éventuelle allergie à la protéine de la caséine du lait ou à ses conservateurs benzoate.

MODE D'EMPLOI
INDICATIONS
a. Avant et après traitement de blanchiment.
b. Après un détartrage à la main ou aux ultrasons et après surfaçage radiculaire.
c. A la suite d'un traitement de nettoyage professionnel.
d. Après application de pâte fluorée.
e. Pour soulager les patients souffrant d'érosion, xérostomie ou syndrome de Sjögrens.
f. Au cours d'un traitement orthodontique.
g. Pour les patients à haut risque carieux.
h. Pour patients présentant des exigences particulières.

Application au Cabinet :
I. Application avec un porte empreinte
1. Avant utilisation, rincer abondamment à l'eau courante le porte-empreinte individuel.
2. Appliquer une couche généreuse de GC Tooth Mousse dans le porte empreinte et appliquer sur les dents supérieures et inférieures.
3. Laisser en bouche au minimum 3 minutes.
4. Retirer le porte empreinte.
5. Demander au patient de étaler les restes de pâtes avec sa langue, l'ai demander de bouger sa langue pendant que possible de cette manière (mini. 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
6. Demander au patient de cracher soigneusement et d'éviter de se rincer la bouche. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissiperont progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.
7. Les restes de GC Tooth Mousse dans le porte-empreinte doivent être rincés ou brossés sous eau courante aussitôt après utilization.

II. Application sans porte-empreinte
1. Si nécessaire, retirer les excès de salive de la surface des dents avec une boulette de coton. Toutefois, il n'est PAS necessaire de sécher les dents avec de l'air comprimé.
2. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les surfaces des dents avec un tampon, un doigt ganté ou avec une brosse interproximale dans les zones difficile d'accès.
3. Laisser GC Tooth Mousse en place au minimum 3 minutes.
4. Demander au patient de étaler les restes de pâtes avec sa langue, l'ai demander de bouger sa langue pendant que possible (de nouveau 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
5. Demander au patient de cracher soigneusement et d'éviter de se rincer la bouche. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissiperont progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

Application à domicile :
III. Application quotidienne après le brossage des dents comme recommandée par votre dentiste
1. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois doit être appliquée sur chaque arcade. Etaler avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC Tooth Mousse.
2. Laisser GC Tooth Mousse sur les dents pendant au moins 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC Tooth Mousse dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissiperont progressivement. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

IV. Application nocturne après brossage des dents telle que recommandée par le praticien
1. Appliquer une quantité suffisante de GC Tooth Mousse sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois par arcade est conseillé. Le matériau doit être appliqué sur les surfaces des dents avec un doigt propre ou un coton tige. Pour les zones difficiles (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC Tooth Mousse.
2. Laisser GC Tooth Mousse sur les dents pendant au moins 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC Tooth Mousse dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC Tooth Mousse et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC Tooth Mousse sur la surface des dents se dissiperont progressivement au cours de la nuit. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

PARFUMS
Fraise, Melon, Vanille, Menthe, Tutti-Frutti

CONSERVATION
Pour des performances optimales, conserver dans une endroit frais et sec et à l'abri des rayons de soleil (5-25°C; 40,4-77,0°F).

CONDITIONNEMENT
Tube de 40g (35mL)
1. Coffret assortiment
10x40g (2 de chaque parfum: Fraise, Melon, Vanille, Menthe, Tutti-Frutti)
2. Coffret arôme unique
10 x 40g de parfum Vanille, Fraise, Melon**, Tutti-Frutti**, Menthe
**Disponible en Europe seulement
3. Recharge
1 tube de 40g de chaque parfum

NOTE
GC Tooth Mousse est une formule unique de CPP-ACP développée à l'école des Sciences dentaires de l'Université de Melbourne, Victoria, Australie.
*RECALDENT est une marque de fabrique utilisée sous licence. La technologie CPP-ACP fait l'objet de brevets d'invention enregistrés ou en cours d'homologation en Australie, NZ, Europe, Canada, et USA.

CAUTION
1. Toujours replacer le capuchon après utilisation et retirer les résidus de pâte et d'humidité autour du bacon et du capuchon.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin.
3. En cas de projection sur les vêtements, nettoyer à l'eau.
4. Si le moindre symptôme d'angio-oedème est observé, il sagit probablement d'une sensibilité ou allergie au conservateur benzoate ou de tout autre composant du produit tel que les arômes artificiels. Dès lors, cesser toute utilisation ce ce produit et consulter un médecin.

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur:
http://www.gceurope.com/ Printed on: 10 May 2023

Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

Dernière mise à jour : 04/2018

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. IT

GC Tooth Mousse™

CREMA PER USO TOPICO CONTENENTE CALCIO E FOSFATO BIODISPONIBILI

Il prodotto deve essere utilizzato da un professionista dentale o sotto la sua supervisione, nelle indicazioni raccomandate.

DESCRIZIONE
GC Tooth Mousse è una crema a base di acqua contenente RECALDENT™ (CPP-ACP: Fosfopeptide caseinico - fosfato calcico amorfo). Quando CPP-ACP viene applicato in ambiente orale, si lega al biofilm, alla placca, ai batteri, all'idrossiapatite e ai tessuto molle, localizzando il calcio e il fosfato biodisponibili.

AVVERTENZA
La saliva incrementa l'efficacia del CPP-ACP e l'aroma contribuisce a stimolare la produzione di saliva. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca del CPP-ACP e della saliva e migliori saranno i risultati.

Una pasta per uso topico contenente calcio e fosfato biodisponibili:
1. Fornisce una protezione extra per i denti.
2. Contribuisce a neutralizzare le stimolazioni acide in risposta alla presenza di batteri acidogeni nella placca.
3. Contribuisce a neutralizzare le stimolazioni acide in risposta alla presenza di altre fonti acide interne ed esterne.

CONTROINDICAZIONI
RECALDENT™ (CPP-ACP) deriva dalla caseina del latte. Evitare di usare questo materiale su pazienti notoriamente a probabilmente affetti da allergia alla proteina del latte e/o con sensibilità o allergia ai conservanti benzoati.

ISTRUZIONI PER L'USO
INDICAZIONI
a. Prima e dopo biancamenti in studio.
b. Immediatamente dopo detartraggio manuale o con ultrasuoni o dopo il planing della radice.
c. Dopo un intervento di igiene orale professionale.
d. Dopo l'applicazione topica di fluoro.
e. Per realizzare una protezione topica in pazienti affetti da erosione, xerostomia o sindrome di Sjögren.
f. Durante i trattamenti ortodontici.
g. Per pazienti ad alovato rischio di carie.
h. Per pazienti con esigenze speciali.

Applicazione in studio:
I. Applicazione con portaimpronta individuale
1. Risciacquare accuratamente sotto acqua corrente il portaimpronta prima dell'uso.
2. Stendere uno strato generoso di GC Tooth Mousse nel portaimpronta e applicare sull'arcata superiore e/o inferiore.
3. Lasciare in bocca per un minimo di 3 minuti.
4. Rimuovere il portaimpronta.
5. Chiedere al paziente di stendere con la lingua la quantità residua di GC Tooth Mousse in tutta la bocca e di trattenerla il più a lungo possibile (1-2 minuti) evitando di espettorare o deglutire. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca di GC Tooth Mousse e della saliva e migliori saranno i risultati.
6. Chiedere al paziente di espettorare bene tutto il prodotto, possibilmente evitando di sciacquare la bocca. Ogni ulteriore residuo di GC Tooth Mousse si dissolverà da solo gradualmente. Consigliare al paziente di non mangiare o bere per 30 minuti dopo l'applicazione.
7. Gli eventuali residui di GC Tooth Mousse rimasti nel portaimpronta dovrebbero essere eliminati immediatamente dopo l'uso sotto l'acqua corrente utilizzando una spazzola o l'acqua stessa.

II. Applicazione senza portaimpronta
1. Se necessario, eliminare la saliva in eccesso presente sulla superficie dei denti utilizzando un tampone o un tamponcino di cotone, NON è comunque necessario asciugare i denti con aria compressa.
2. Applicare una quantità sufficiente di GC Tooth Mousse sulle superficie del dente usando un tampone, un dito - indossando i guanti, o uno scovolino per le aree interprossimali difficili.
3. Lasciare riposare il GC Tooth Mousse nella bocca per un minimo di tre minuti.
4. Chiedere al paziente di stendere con la lingua la quantità residua di GC Tooth Mousse in tutta la bocca e di trattenerla il più a lungo possibile (1-2 minuti) evitando di espettorare o di deglutire. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca di GC Tooth Mousse e della saliva e migliori saranno i risultati.
5. Chiedere al paziente di espettorare bene tutto il prodotto, possibilmente evitando di sciacquare la bocca. Ogni ulteriore residuo di GC Tooth Mousse si dissolverà da solo gradualmente. Consigliare al paziente di non mangiare o bere per 30 minuti dopo l'applicazione.

Applicazione domiciliare:
III. Applicazione quotidiana dopo spazzolamento secondo raccomandazioni del dentista
1. Applicare una quantità sufficiente di GC Tooth Mousse sull'arcata superiore e inferiore. La quantità minima necessaria di prodotto è pari alle dimensioni di un pisello per ciascuna arcata. Il materiale dovrebbe essere applicato sulle superfici dentali con un dito pulito e asciutto o una punta di cotone. Per le aree più difficili (tra i denti) è opportuno usare uno scovolino interprossimale o il filo interdentale rivestito di GC Tooth Mousse.
2. Lasciare riposare il GC Tooth Mousse sulle bocca per un minimo di tre minuti.
3. Quindi, stendere con la lingua in tutta la bocca la quantità residua di GC Tooth Mousse. Tenere in bocca il prodotto più a lungo possibile (altri 1 - 2 minuti) evitando di sputarlo e aspettando a deglutire. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca di GC Tooth Mousse e della saliva e migliori saranno i risultati.
4. Espettora tutto il prodotto, possibilmente evitando di sciacquare. Gli eventuali residui di GC Tooth Mousse presenti sulla superficie non devono necessariamente essere rimossi in quanto verranno eliminati gradualmente durante la notte. Consigliare al paziente di non mangiare o bere per 30 minuti dopo l'applicazione.

IV. Applicazione notturna dopo aver lavato i denti secondo le raccomandazioni del dentista
1. Applicare una quantità sufficiente di GC Tooth Mousse sull'arcata superiore e inferiore. La quantità minima necessaria di prodotto è pari alle dimensioni di un pisello per ciascuna arcata. Il materiale dovrebbe essere applicato sulle superfici dentali con un dito pulito e asciutto o una punta di cotone. Per le aree più difficili (tra i denti) è opportuno usare uno scovolino interprossimale o il filo interdentale rivestito di GC Tooth Mousse.
2. Lasciare riposare il GC Tooth Mousse sulle bocca per un minimo di tre minuti.
3. Quindi, stendere con la lingua in tutta la bocca la quantità residua di GC Tooth Mousse. Tenere in bocca il prodotto più a lungo possibile (altri 1 - 2 minuti) evitando di sputarlo e aspettando a deglutire. Maggiore è il tempo di permanenza in bocca di GC Tooth Mousse e della saliva e migliori saranno i risultati.
4. Espettora tutto il prodotto, possibilmente evitando di sciacquare. Gli eventuali residui di GC Tooth Mousse presenti sulla superficie non devono necessariamente essere rimossi in quanto verranno eliminati gradualmente durante la notte. Consigliare al paziente di non mangiare o bere per 30 minuti dopo l'applicazione.

AROMI
Fragola, Melone, Vaniglia, Menta, Frutti assorti

CONSERVAZIONE
Per un utilizzo ideale del prodotto conservare in luogo fresco a basso tasso di umidità, lontano dalla luce solare diretta (5-25°C; 40,4-77,0°F).

CONFEZIONI
Tubetto da 40g (35mL)
1. Confezione assortita
10 x 40g tubetti (2 per ciascun gusto - Fragola, Melone, Vaniglia, Menta, Frutti assortiti)
2. Confezione gusto singolo
10 x 40g tubetti a scelta di ciascun gusto Vaniglia, Fragola, Melone**, Tutti-Frutti**, Menta
**Disponibile solo in Europa
3. Ricariche
1 tubetto x 40g per ciascun gusto

NOTA
GC Tooth Mousse con la sua formulazione unica di CPP-ACP è stato sviluppato dalla facoltà di odontoiatria dell'Università di Melbourne, Victoria, Australia.
*RECALDENT è un marchio ed è usato sotto licenza. La tecnologia CPP-ACP è registrata o in corso di registrazione in Australia, Nuova Zelanda, Europa, Canada e Usa.

AVVERTENZE
1. Richiudere sempre la confezione con il tappo dopo aver usato il prodotto e togliere tutta la pasta residua o l'umidità formatasi intorno al collo del tubetto e all'interno del tappo.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e consultare un medico.
3. Se il prodotto viene a contatto con indumenti, rimuoverlo sciacquando con acqua.
4. Eventuali sintomi di angioedema possono indicare sensibilizzazione o allergia ai conservanti benzoati o ad altri componenti del prodotto quali l'additivo aromatizzante. In questo caso, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d'uso possono essere classificati come pericolosi secondo il GHS. Fate costante riferimento alle schede di sicurezza disponibili su:
http://www.gceurope.com/

Possono anche essere richieste al fornitore.

Ultima revisione : 04/2018

Antes de usar, lea detenidamente las instrucciones de uso. ES

GC Tooth Mousse™

CREMA TÓPICA CON CALCIO Y FOSFATO BIODISPONIBLE

Sólo para uso de profesionales de la odontología en las indicaciones recomendadas.

DESCRIPCIÓN
GC Tooth Mousse es una crema a base de agua que contiene RECALDENT™ (CPP-ACP: Fosfopéptido de caseína - fosfato cálcico amorfo). Cuando CPP-ACP es aplicado en el medio oral, los moléculas CPP-ACP se unen a la biopelícula, placa, bacterias, hidroxiapatitas y al tejido blando, localizando el calcio y fosfato biodisponible.

IMPORTANTE
La saliva mejora la efectividad del compuesto CPP-ACP y el sabor ayudará a estimular el flujo salival. Cuanto más tiempo se mantenga en la boca CPP-ACP y saliva, más efectivo será el resultado.

Una crema tópica que contiene Calcio y Fosfato biodisponible.
1. Aporta extra protección a los dientes.
2. Ayuda a neutralizar los ácidos causados por las bacterias acidogénicas de la placa.
3. Ayuda a neutralizar los ácidos de otras fuentes de ácido internos y externos.

CONTRAINDICACIONES
RECALDENT™ (CPP-ACP) es un derivado de la caseína de la leche. No use este producto en pacientes con probada o probable alergia a la proteína de la leche y/o con sensibilidad o alergia a conservantes de benzoatos.

INSTRUCCIONES DE USO
INDICACIONES
a. Antes y después de un blanqueamiento en clínica.
b. Tras un pulido con bicarbonato o curetaje.
c. Tras una limpieza dental profesional (PTC).
d. Tras aplicación tópica de Flúor.
e. Para aportar una capa tópica en pacientes que sufren erosión, xerostomía o síndrome de Sjögren's.
f. Durante el tratamiento ortodóntico.
g. Para pacientes con alto riesgo de caries.
h. Para pacientes con necesidades especiales.

Aplicación en clínica:
I. Aplicación con cubeta:
1. Antes de usar limpie la cubeta cuidadosamente bajo agua corriente.
2. Vierta una capa generosa de GC Tooth Mousse en la cubeta y aplique en los dientes superiores y / o inferiores.
3. Deje la cubeta en la boca por un mínimo de 3 minutos.
4. Retire la cubeta.
5. Pida al paciente que utilice la lengua para extender GC Tooth Mousse por toda la boca. Aconseje al paciente que no coma durante todo el aviando expectorando o tragando. Cuanto más tiempo se mantenga GC Tooth Mousse en la saliva y la boca, más efectivo será el resultado.
6. Pida al paciente que expectore y si es posible que evite lavarse. Cualquier resto de GC Tooth Mousse puede dejarse para que se disipe gradualmente. Advertirle que no debe comer o beber durante los 30 minutos siguientes a la aplicación.

II. La cubeta no se adapta bien:
1. Si es necesario, elimine cualquier exceso de saliva en la superficie del diente con una bolita de algodón o rollo de celulosa. En cualquier caso, NO es necesario secar el diente con aire comprimido.
2. Aplique una suficiente cantidad de GC Tooth Mousse en la superficie del diente usando una torunda, el dedo enguantado o en áreas interproximales de difícil acceso usar un cepillo de dientes interproximal.
3. Deje actuar GC Tooth Mousse durante al menos 3 minutos.
4. A continuación, pida al paciente que use la lengua para extender GC Tooth Mousse por toda la boca. Solicítele que lo mantenga en la boca durante todo el tiempo posible (1 - 2 minutos adicionales) evitando expectorar o deglutir. Cuanto más tiempo se mantenga GC Tooth Mousse en la boca, más efectivo será el resultado.
5. Pida al paciente que expectore y si es posible que evite lavarse. Cualquier resto de GC Tooth Mousse puede dejarse para que se disipe gradualmente. Advertirle que no debe comer o beber durante los 30 minutos siguientes a la aplicación.

Aplicación en casa:
III. Aplicación diaria tras cepillado como recomendada por el profesional dental
1. Aplique suficiente cantidad de GC Tooth Mousse en los dientes superiores e inferiores. El mínimo requerido es una cantidad del tamaño de un guisante en cada arco. El material se debe aplicar en la superficie

Læs omhyggeligt brugsanvisningen inden brug. DA

GC Tooth Mousse™

LAVVISKØS PASTA MED KALCIUM OG FOSFAT TIL LOKAL INTERORAL BRUG

Anvendes af eller under vejledning af det professionelle tandlægeteam til de anbefalede indikationer.

BESKRIVELSE
GC Tooth Mousse er en vandbaseret lavviskøs pasta der indeholder RECALDENT™* CPP-ACP (Casein Phosphopeptide–Amorphous Calcium Phosphate), hår CPP-ACP bliver anvendt i små mål, så længe det består af biofilm, plaque, bakterier, hydroxyapatite samt tandsæbe. Dette sker ved at pastaen binder til tilgængelig kalcium og fosfater hos disse substanser.

VIGTIGT
Sayli vilar fenge effekt/virkelen af CPP-ACP og smagen vil stimulere spytsekretionen. Jo længere CPP-ACP og spytter fortliver i munden, jo bedre er resultat opnås.

Lavviskøs pasta med biologiskt tillgängligt kalcium og fosfat til lokalt intraoralt bruk:
1. Giver sikker beskyttelse af tænderne.
2. Hjælper til med at neutralisere syreangreb fra bakterier i plaque.
3. Hjælper til med at neutralisere syreangreb fra andre interne og eksterne syrekilder hjælper.

KONTRAINDIKATIONER
RECALDENT™ (CPP-ACP) er et derivat fra mælkekasein. Anvend ikke produktet til personer med konstateret mælkeallergi eller mistænkt herfor og/eller med allergi eller følsomhed for benzoater.

BRUKSANVISNING
INDIKATIONER
a. Før og efter blegning.
b. Efter ultralydsbehandling, depuration eller rodbehandling.
c. Efter professionel tandrensning (P.T.C.).
d. Efter applicering af hjørbehandling.
e. For at øge beskyttelse hos patienter der lider af erosion, xerostomia eller Sjögrens syndrome.
f. Under ortodontisk behandling.
g. Til patienter med nedsat spytkvalitet.
h. Til patienter med specielle behov.

Til anvendelse på klinikken:
I. Applicering med standardske
1. Inden brug skylles skeen under rindende vand.
2. Pålæ et lille stykke (2 cm. pasta til hver tand og sæt den på pladi] over eller underwunden.
3. Lad skeen være uforstyrret minimum 3 minutter i munden.
4. Fjern skeen.
5. Instruer patienten i at forelde resterende GC Tooth Mousse rundt i munden med tungen, Instruer også patienten om ikke at synke eller spytte ud, så længi tid som muligt (1–2 minutter), da længer GC Tooth Mousse og sayliv i munden ,o mere effektivt bliver tandsundhed.
6. Bed patienten om at spytte overskydende pasta ud. Ydertigere rester af GC Tooth Mousse kan efterlades på tændernes overflade. Dette vil gradvis forsvinde. Anbefal patienten om ikke at spise eller drikke 30 minutter efter behandlingen.
7. Overskydende GC Tooth Mousse i skeen skylles væk under rindende vand.

II. Application uden ske
1. Ved store områder påfør salv på tandfladen, så fjernes dette med en bomuldsrulle eller en pellet. Det er ikke nødvendig at tørre tænderne med komprimeret luft.
2. Applicer en tilstrækkelig mængde GC Tooth Mousse til tandfladen med en serviet, behandsket finger eller i vanskelig tilgængelige interproximale rum en interdental børste.
3. Lad GC Tooth Mousse være uforstyrret min mum 3 minutter i munden,
4. Instruer patienten i at lade tungen forelde resterende GC Tooth Mousse rundt i hele munden. Patienten instrueres også i det nedenstående at holde spyt og ost nærkontakt så længe som muligt (1–2 minutter) uden at synke eller spytte ud. Jo længere GC Tooth Mousse og salv er GC Tooth Mousse og salv er i munden, jo mere effektiv er sårbeskyttelsen.
5. Bed patienten om at spytte overskydende pasta ud. Ydertigere rester af GC Tooth Mousse kan efterlades på tændernes overflade. Dette vil gradvis forsvinde. Anbefal patienten om ikke at spise og drikke før 30 minutter efter behandlingen.

Til anvendelse hjemme:
I. Daglig applicering efter tandbørstning som anbefalet af tandlæge/tandplejer
1. Applicer en sufficient mængde GC Tooth Mousse Plus til tænderne i under og overmunden. Ca.1/2 cm. pasta til hver tand/skeen under og overkabe anbefales som minimumsmængde. Materialet kan fordeles med en finger eller en blød børste. Til vanskelige tilgængelige interproximale rum en mellemmumsmæssig tandrød påført GC Tooth Mousse Plus.
2. Lad GC Tooth Mousse være uforstyrret minimum 3 minutter i munden.
3. Anvend tungen til at fordel overskydende GC Tooth Mousse Plus rundt i munden. Hold det i munden så længe som muligt (1—2 minutter) undgå at spytte pastaen ud eller synke den, Jo længere GC Tooth Mousse og salv er i munden, jo mere effektivt er sårbeskyttelsen.
4. Spyt herefter materialet ud og lad vare med at skylle efter. Ydertigere rester af GC Tooth Mousse kan efterlades på tændernes overflader. Dette vil gradvis forsvinde. Undgå at spise og drikke 30 minutter efter behandlingen.

I\Nat benhandling efter tandbørstning som anbefalet af tandlæge/tandplejer
1. Applicer en sufficient mængde GC Tooth Mousse Plus til tænderne i under og overmunden. Ca.1/2 cm. pasta til hver/skeen under og overkabe anbefales som minimumsmængde. Materialet kan fordeles med en finger eller en blød børste. Til vanskelige tilgængelige interproximale rum en mellemmumsmæssig tandrød påført GC Tooth Mousse Plus.
2. Lad GC Tooth Mousse være uforstyrret minimum 3 minutter i munden.
3. Anvend tungen til at fordel overskydende GC Tooth Mousse Plus rundt i munden. Hold det i munden så længe som muligt (1—2 minuter) undgå at spytte pastaen ud eller synke den, Jo længere GC Tooth Mousse og salv er i munden, jo mere effektivt er sårbeskyttelsen.
4. Spyt herefter materialet ud og lad vare med at skylle efter. Overskydende GC Tooth Mousse Plus kan efterlades på overfladen og vil gradvis forsvinde under nattens forløb. Undgå at spise og drikke 30 minutter efter behandlingen.

SMAG
Jordbær, Melon, Vanilje, Mint, Tutti-Frutti

OPBEVARING
Se optimalt resultat skal, opbevares i et koldt ventilert rum uden direkte sollys (8– 25°C, 46,4– 77,0°F).

FORPAKNING
Tube med 40g (35mL)
1. Assortiert Pakning
10 x 40g tuber (2 stk. Af hver Jordbær, Melon, Vanilje, Mint, Tutti-Frutti)
2. Pakning med en smagsvariant
10 x 40g tuber i hver af følgende smagsvarianter Vanilje, Jordbær, Melon**, Tutti-Frutti**, Mint
***Kun tilgængelig i Europa
3. Refill Pakning
1 x 40g tube i hver smag

BEMÆRK
GC Tooth Mousse Plus med sin unikke CPP-ACP formel er udviklet af: The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australien.
*RECALDENT er et varemærke og anvendes med licens, CPP-ACP-teknologien er patenteret og omfattet af patentregler i Australien, NZ, Europa, Canada, og USA.

BEMÆRK
1. Sæt altid hætten på igen og fjern overskydende pasta efter fugt rund om tubens åbning og inden hætten.
2. I tilfælde af at materialet kommer i øjnene så skal der skylles grundigt med vand og herefter skal der søges lægehjælp.
3. Materialet der er kommet på tøj, vasses bort med vand.
4. Hvis der opstår nogle former for angioedema symptomer så kan dette være et udtryk for sensitivitetsallergi for benzoate indholdsstoffer eller andre af de komponenter som er individuelt i produktet eksempelvis smagsstofferne, I dese tilfælde, så skal anvendelse af produktet stoppes og en lage kontaktes.

Nogle produkter som er beskrevet i IFU er evt. klassificeret som farlig i hht GHS. Læs altid op på alle erhvejlygivende anvisninger som kan findes på http://www.gceurope.com/
De kan altid rekvireres hos dit depot.

Sidst revideret : 04/2018

Läs noggrant anvisningarna innan användning. SV

GC Tooth Mousse™

LÅGVISKÖS PASTA MED FRITT KALCIUM OCH FOSFAT FÖR LOKALT INTRAORALT BRUK

Används av eller under övervakande av utbildad tandvårdspersonal inom de rekommenderade indikationerna.

BESKRIVNING
GC Tooth Mousse är en vattenbaserad lågviskös pasta som innehåller RECALDENT™* (CPP-ACP: Kasein Fosfopeptid—Amorft Kalciumfosfat). När CPP-ACP appliceras i den orala miljön, kommer den att binda till biofilm, plaque, bakterier, hydroxyapatit samt mjukvävnad. Det kommer i en tur att bindakera tillgängligt kalcium och fosfater hos dessa substanser.

VIKTIGT
Sayli ökar effektiviteten av CPP-ACP och smaken kommer att stimulera salivflödet. Ju längre CPP-ACP och salv hålls kvar i munnen, desto effektivare resultat.

Lågviskös pasta med fritt kalcium och fria fosfater för lokalt intraoralt bruk:
1. Ger extra skydd för tänderna.
2. Hjälper till att neutralisera syraattacker från bakterierna i plaque.
3. Hjälper till att neutralisera syraattacker från andra interna och externa källor innehållande syror.

KONTRAINDIKATIONER
RECALDENT™ (CPP-ACP) är ett derivat från mjölkkasein. Använd inte produktet till personer med konstaterat mjölkallergi och/eller med en känslighet eller allergi mot konserveringsmedel med bensoatinnehåll.

BRUKSANVISNING
INDIKATIONER
a. Innan och efter blekbehandling.
b. Efter ultraljudsbehandling, depuration eller rotplaning.
c. Efter professionell tandrengöring (P.T.C.).
d. Efter applicering av hyperbehandling.
e. För att öka skyddet hos patienter som lider av, xerostomi eller Sjögrens syndrom.
f. Under ortodontisk behandling.
g. För högkänsliga patienter.
h. För patienter med nedsatta behov.

Professionell applicering:
I. Applicering med standardsked
1. Skölj skeen med rinnande vatten innan användning.
2. Tryck ut en generös mängd GC Tooth Mousse i skeden och sätt den på plats i över- och underkäken.
3. Låt GC Tooth Mousse värka under minimum 3 minuter i munnen.
4. Ta bort skeen.
5. Instruera patienten att använda tungan för att sprida ut återstående GC Tooth Mousse i hela munnen. Instruera också patienter att hålla kvar pastan så länge som möjligt (1–2 minuter). Patienten skall undvika att hosta under behandlingen. Ju längre GC Tooth Mousse och salv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir skyddseffekt.
6. Be patienten att spotta ut rester och om möjligt undvika att skölja. Ytterligare rester av GC Tooth Mousse kan lämnas på tändernas ytor. Dessa kommer att gradvis att försvinna. Rekommendera patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applicering.
7. Efter användning, skölj bort restarna av GC Tooth Mousse som kan finnas kvar i skeden under rinnande vatten.

II. Applicering utan sked
1. Om mindredigt, avlägsna överskottssalv på tandytan med en bomullsrulle eller pellet. Det är inte nödvendigt att torka/ga tänderna med tryckluft.
2. Applicera en lämplig mängd GC Tooth Mousse på tandytan genom att använda en ren blindkjl, applicerarinnetyg, handskbeklätt finger eller en interdentalborste i approximala utrymmen där det är svårt att komma åt.
3. Låt GC Tooth Mousse värka under minimum 3 minuter i munnen.
4. Instruer patienten att använda tungan för att sprida ut återstående GC Tooth Mousse i hela munnen. Instruera också patienten att hålla kvar pastan så länge som möjligt där (~2 minuter). Patienten skall undvika att hosta under behandlingen. Ju längre GC Tooth Mousse och salv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir skyddseffekt.
5. Be patienten att spotta ut rester och om möjligt undvika att skölja. Ytterligare rester av GC Tooth Mousse kan lämnas på tändernas ytor. Dessa kommer att gradvis att försvinna. Rekommenderas patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applicering.

Hemmabruk:
II. Daglig applicering efter tandborstning på rekommendation av tandläkare
1. Applicera en lämplig mängd GC Tooth Mousse på tändarna i både över-och underkäke. En bras storlek rekommenderas för varje käke, Materialet appliceras på tandytan med ett rent torrt finger eller en bomullspinne. För svåråtkomliga områden (mellan tändarna) används en mellanmunsborste eller tandtråd täckt med GC Tooth Mousse.
2. Låt GC Tooth Mousse värka under minimum 3 minuter i munnen.
3. Använd tungan för att sprida ut återstående GC Tooth Mousse i hela munnen. Håll kvar pastan i munnen så länge som möjligt (1–2 minuter) och undvik att spotta ut. Ju längre GC Tooth Mousse och salv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir skyddseffekt.
4. Spotta ut och om möjligt undvik att skölja. Ytterligare rester av GC Tooth Mousse kan lämnas på tändernas ytor. Dessa kommer att gradvis att försvinna. Rekommenderas patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applicering.

I\Användning efter natten efter tandborstning rekommenderas att tandvårdspersonal
1. Applicera en lämplig mängd GC Tooth Mousse på tändarna i både över-och underkäke. En bras storlek rekommenderas för varje käke, Materialet appliceras på tandytan med ett rent torrt finger eller en bomullspinne. För svåråtkomliga områden (mellan tändarna) används en mellanmunsborste eller tandtråd täckt med GC Tooth Mousse.
2. Låt GC Tooth Mousse värka under minimum 3 minuter i munnen.
3. Använd tungan för att sprida ut återstående GC Tooth Mousse i hela munnen. Håll kvar pastan i munnen så länge som möjligt (1–2 minuter) och undvik att spotta ut. Ju längre GC Tooth Mousse och salv hålls kvar i munnen, desto effektivare blir skyddseffekt.
4. Spotta ut och om möjligt undvik att skölja. Ytterligare rester av GC Tooth Mousse kan lämnas på tändernas ytor. Dessa kommer att gradvis att försvinna. Rekommenderas patienten att inte äta eller dricka under de närmaste 30 minuterna efter applicering.

SMAKER
Jordgub, Melon, Vanilj, Mint, Tutti-Frutti

FÖRVARING
För optimala resultat, förvaras på en svalt och torr plats med låg luftfuktighet. Förvaras inte i direkt solljus (8–25°C, 46,4– 77,0°F).

FÖRPACKNINGAR
Tub innehållande 40g (35ml)
1. Sortiment Förpackning
10 x 40g tuber (2 st av vardera Jordgubbe, Melon, Vanil, Mint, Tutti-Frutti)
2. Förpackning med en Sälor
10 x 40g de cado sabor: vaunilla, morango, melão**, tutti-frutti**, mint
***Endast tillgänglig i Europa
3. Refillförpackning
1 x 40g tub i varje smak

NOTERA
GC Tooth Mousse med dess unika CPP-ACP formula utvecklades på The School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australien.
*RECALDENT är ett varumärke och används med licens, CPP-ACP-teknologin är patenterad och omfattar at patentregler i Australien, NZ, Europa, Canada, og USA.

OBS!
1. Avlägsna eventuellt spill runt tubens öppning eller på insidan av hatten och skruva sedan på locket på tuben och dra åtminstone en gång.
2. Om det skulle komma i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med vatten och uppsök läkare.
3. Rull med kläder, tvätta bort med vatten.
4. Om några symptom med angioödem uppträcka kan det indikera känslighet eller allergi mot konserveringsmedlet som används, eller mot några andra komponenter i produkten såsom något smakåtföringsämne. Om så sker avbryt användning av produkten och kontakta tillläkare.

Vissa produkter som hänvisas till i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS, Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på http://www.gceurope.com/
Dessa kan också emailas från din leverantör.

Reviderad senast : 04/2018

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as instruções de utilização. PT

GC Tooth Mousse™

CREME TÓPICO COM CÁLCIO E FOSFATO BIODISPONÍVEIS

A ser utilizado apenas por um profissional dentário para as indicações recomendadas.

Descrição
A GC Tooth Mousse é um creme aquoso que contém RECALDENT™* (CPP-ACP: Fosfopeptido de Caseína—Fosfato de Cálcio Amorfo). Ao ser aplicado no ambiente oral, o CPP-ACP liga-se a biofilmes, à placa dentária, à bactérias, à hidroxiapatite e ao tecido mole, localizando o cálcio e o fosfato biodisponíveis.

Importante:
A saliva aumenta a eficácia do CPP-ACP e o sabor ajuda a estimular a produção de saliva. Quanto mais tempo se mantiver o CPP-ACP e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.

Pasta tópica com cálcio e fosfato biodisponíveis
1. Fornece protecção extra aos dentes.
2. Ajuda a neutralizar as agressões dos ácidos produzidos pelas bactérias acidogénicas na placa bacteriana.
3. Ajuda a neutralizar as agressões dos ácidos de outras fontes internas e externas.

CONTRA-INDICAÇÕES
O RECALDENT™ (CPP-ACP) é derivado da caseína do leite. Não utilizar este material em dentes com suspeita de ou alergia comprovada à proteína ou leite e/ou que apresentem sensibilidade ou alergia a conservantes à base de benzoatos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
INDICAÇÕES
a. Antes e depois do branqueamento no consultório.
b. Após a destartarização ultrassónica, a curetagem ou o alisamento radicular.
c. Após a limpeza profissional dos dentes.
d. Após a aplicação tópica de flúor.
e. Para providenciar um revestimento tópico em dentes que sofram de erosão dentária, xerostomia ou síndroma de Sjögren's.
f. Durante o tratamento ortodôntico.
g. Para pacientes com risco de desenvolver lesões de cárie.
h. Em doentes com necessidades especiais.

Aplicação no consultório:
I. Aplicação com colher/a standard
1. Antes de utilizar, lave bem a moldeira individual com água corrente.
2. Coloque uma quantidade generosa de GC Tooth Mousse dentro da moldeira e aplique aos dentes superiores e/ou inferiores.
3. Mantenha a colher/a moldeira na boca durante pelo menos 3 minutos.
4. Retire a moldeira.
5. Diga ao doente que use a língua para espalhar a restante GC Tooth Mousse na boca. Diga ao doente que mantenha o produto na boca o máximo tempo possível (1–2 minutos) evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo se mantiver a GC Tooth Mousse e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.
6. Peça ao doente que cuspa o excesso e não lave a boca com água, se possível. Pode deixar dissipar gradualmente os resíduos de GC Tooth Mousse que restem na superfície. Aconselhe o doente a não comer nem beber durante 30 minutos após a aplicação.
7. Os resíduos de GC Tooth Mousse presentes na moldeira devem ser lavados ao escovados sob água corrente imediatamente após a utilização.

II. Aplicação sem moldeira:
1. Se necessário, remova o excesso de saliva na superfície dos dentes com um rolo ou bola de algodão. Mas NÃO é necessário secar os dentes com ar comprimido.
2. Aplique uma quantidade suficiente de GC Tooth Mousse sobre as superfícies dos dentes com uma zaragatoa de aplicação, o dedo enluvado ou, em áreas interproximais difíceis, com uma Escova de Dentes Interproximal.
3. Mantenha assim a GC Tooth Mousse durante pelo menos 3 minutos.
4. Depois, diga ao doente que use a língua para espalhar o resto da GC Tooth Mousse na boca. Peça ao doente que mantenha o produto na boca o máximo tempo possível (mais 1—2 minutos), evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo se mantiver a GC Tooth Mousse e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado. e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.
5. Peça ao doente que cuspa e evite lavar a boca com água, se possível. Pode deixar dissipar gradualmente os resíduos de GC Tooth Mousse que restem na superfície. Aconselhe o doente a não comer nem beber durante 30 minutos após a aplicação.

Aplicação em casa:
II. Aplicação durante o dia após escovar os dentes, conforme recomendado pelo profissional dentário
1. Aplique uma quantidade suficiente de GC Tooth Mousse aos dentes superiores e inferiores. É necessária pelo menos uma quantidade do tamanho de uma ervilha para cada arcada dentária. O material deve ser aplicado sobre as superfícies dos dentes com um dedo limpo e seco ou com um rolo/ovelo de algodão. Em áreas difíceis (entre os dentes) use uma Escova de Dentes Interproximal ou fio dental coberto de GC Tooth Mousse.
2. Mantenha assim a GC Tooth Mousse nos dentes durante pelo menos 3 minutos.
3. Depois, use a língua para espalhar o resto da GC Tooth Mousse na boca. Mantenha o produto na boca o máximo tempo possível (mais 1—2 minutos), evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo se mantiver a GC Tooth Mousse e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.
4. Cuspa bem o produto e evite lavar a boca com água. Pode deixar dissipar gradualmente os resíduos de GC Tooth Mousse que restem na superfície. Não coma nem beba nos 30 minutos após a aplicação.

I\Aplicação à noite, após escovar os dentes, conforme recomendado pelo profissional dentário
1. Aplique uma quantidade suficiente de GC Tooth Mousse aos dentes superiores e inferiores. É necessária pelo menos uma quantidade do tamanho de uma ervilha para cada arcada dentária. O material deve ser aplicado sobre as superfícies dos dentes com um dedo limpo e seco ou com um rolo/ovelo de algodão. Em áreas difíceis (entre os dentes) use uma Escova de Dentes Interproximal ou fio dental coberto de GC Tooth Mousse.
2. Mantenha assim a GC Tooth Mousse nos dentes durante pelo menos 3 minutos.
3. Depois, use a língua para espalhar o resto da GC Tooth Mousse na boca. Mantenha o produto na boca o máximo tempo possível (mais 1—2 minutos), evitando cuspir e engolir. Quanto mais tempo se mantiver a GC Tooth Mousse e a saliva na boca, mais eficaz é o resultado.
4. Cuspa bem o produto e evite lavar a boca com água. Pode deixar dissipar gradualmente qualquer resíduo de GC Tooth Mousse que não for aplicado. Não coma nem beba nas 30 minutos após a aplicação.

SABORES
Morango, Melão, Baunilha, Menta, Tutti-Frutti

ARMAZENAMENTO
Para uma ótima performance, conservar em local seco e fresco, com baixa humidade, protegido da luz directa do sol (8-25°C, 46,4– 77,0°F).

EMBALAGENS
Tubo com 40g (35mL)
1. Embalagem Variada
10 x 40g (2 de cada: morango, melão, baunilha, menta e tutti-frutti)
2. Embalagem de um Sabor
10 x 40g de cado sabor: vaunilha, morango, melão**, tutti-frutti**, menta
***Embalagem disponível em Europa
3. Refill de Reposição
1 x tubo de 40g de cada sabor

NOTA
A GC Tooth Mousse com a sua formulação exclusiva CPP-ACP foi desenvolvida na School of Dental Science, The University of Melbourne, Victoria, Australia.
*RECALDENT é uma marca comercial licenciada, A tecnologia CPP-ACP tem patentes relacionadas ou patentes pendentes na Australia, NZ, Europa, Canadá o EUA.

CUIDADO
1. Raponha sempre a tampa depois de usar e remova resíduos de pasta ou de humidade em redor da boca do tubo ou do interior da tampa.
2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com água e consulte o médico.
3. No caso de derramar sobre o vestuário, lave com água.
4. Se detectar sintomas de angioedema, estes podem indicar sensibilidade ou alergia aos conservantes à base de benzoato ou a qualquer outro componente do produto, como o agente aromatizante. Nesse caso, interrompa o uso do produto e refira o doente a um médico.

Alguns produtos referenciados nas presentes instruções de utilização podem ser classificados como perigosos de acordo com a GHS. Sempre familiarize-se com as fichas de informação de segurança disponíveis em: http://www.gceurope.com/
Estas também podem ser obtidas através do seu distribuidor.

Última revisão : 04/2018

Πριν από τη χρήση παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. EL

GC Tooth Mousse™

ΚΡΕΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΟ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις προτεινόμενες ενδείξεις.

Περιγραφή
Το υλικό GC Tooth Mousse είναι μία κρέμα με βάση το νερό που περιέχει RECALDENT™* (CPP-ACP: Φωσφοπεπτίδιο της καζεΐνης – Άμορφο φωσφορικό ασβέστιο). Όταν εφαρμόζεται το CPP-ACP σε στοματικά περιβάλλον συνδέεται με βιοφίλμ, πλάκα, βακτήρια, υδροξυαπατίτη και μαλακούς ιστούς συγκεντρώνοντας στις περιοχές αυτές το βιοδιαθέσιμο ασβέστιο και φωσφορικά.

Σημαντικό
Το σάλιο επιτείνει την αποτελεσματικότητα του CPP-ACP και η γεύση του διεγείρει την παραγωγή σάλιου. Όσο περισσότερο παραμένει το CPP-ACP και το σάλιο στο στόμα, τόσο αποδοτικότερη η διαδικασία.

Μία πάστα τοπικής εφαρμογής που περιέχει βιοδιαθέσιμο ασβέστιο και φωσφορικά:
1. Προσφέρει επιπρόσθετη προστασία στα δόντια.
2. Συνεισφέρει στην εξουδετέρωση των όξινων επιθέσεων των οξεογενών βακτηρίων της οδοντικής πλάκας.
3. Συνεισφέρει στην εξουδετέρωση των όξινων επιθέσεων από άλλες εξωτερικές ή εσωτερικές πηγές παρουσιας οξέων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το RECALDENT™ (CPP-ACP) προέρχεται από την καζεΐνη του γάλακτος. Μην χρησιμοποιείτε το υλικό αυτό σε ασθενείς με αποδεδειγμένη αλλεργία στη πρωτεΐνες του γάλακτος και τη αλλεργία ή υπερευαισθησία σε βενζοϊκά παράγωγα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
a. Πριν ή μετά τη διαδικασία λεύκανσης στο ιατρείο.
β. Μετά τη χρήση συσκευής υπερήχων, απορρίμματη μέθοδης απόθεσης.
γ. Μετά από επαγγελματική καθαρισμό των δοντιών.
δ. Μετά από τοπική εφαρμογή.
ε. Σε τοπικά επικάλυψη σε ασθενείς που υποφέρουν από διαβρωσιακές, ξηροστομία ή σύνδρομο Sjögren's.
στ. Κατά τη διάρκεια ορθοδοντικής θεραπείας.
ζ. Σε ασθενείς με μειωμένη ποιότητα σιελόνου.
η. Σε ασθενείς με ειδικές ανάγκες.

Εφαρμογή στο ιατρείο:
I. Εφαρμογή με προκατασκευασμένο να νάρθηκα
1. Πλύν στο με νερό βρύσης βεπλύνετε το δίσκο κάτω από τη τρεχούμενο νερό.
2. Εξωθήστε ικανοποιητική ποσότητα του υλικού GC Tooth Mousse στο δίσκο και τοποθετήστε το στο άνω και/ή κάτω δόντια.
3. Αφήστε το δίσκο χωρίς ενόχληση στο στόμα για ελάχιστο διάστημα 3 λεπτών.
4. Αφαιρέστε το δίσκο.
5. Συμβουλεύστε τον ασθενή να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του για να διασκορπίσετε το GC Tooth Mousse σε όλο το στόμα. Συμβουλεύστε τον ασθενή να κρατήσει το υλικό στο στόμα του για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (επτά λεπτά ~2 λεπτά) χωρίς απορρόφηση ή καθαρσιρούντας την κατάποση. Όσο περισσότερο μείνει το GC Tooth Mousse και το σάλιο στο στόμα, τόσο αποτελεσματικότερη η διαδικασία.
6. Πείτε στον ασθενή να φτύσει και να αποφύγει να ξεπλύνει με νερό. Μην καταπιούν το υλικό για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (επτά λεπτά ~2 λεπτά) χωρίς απορρόφηση ή καθαρσιρούντας την κατάποση. Όσο περισσότερο παραμένει το GC Tooth Mousse και το σάλιο στο στόμα, τόσο αποτελεσματικότερη η διαδικασία.
7. Πείτε στον ασθενή να φτύσει και να αποφύγει να ξεπλύνει με νερό. Κάθε περίσσεια του GC Tooth Mousse που παραμένει στα οδοντικές επιφάνειες μπορεί να παραμείνει μετά την αποδοθεί σταδιακά. Συμβουλεύστε τον ασθενή να μην φάει για τρία τουλάχιστον λεπτά μετά την εφαρμογή.

Εφαρμογή χωρίς τη θήκη:
II. Εφαρμογή κατά τη θήκαια της ημέρας μετά το βούρτσισμα των δοντιών όπως συνήγησε από οδοντιατρο
1. Τοποθετήστε ικανοποιητική ποσότητα του υλικού GC Tooth Mousse στα άνω και κάτω δόντια. Η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα υλικού για κάθε οδοντικό τόξο πρέπει να είναι περίπου μία ερέβη, το υλικό πρέπει να τοποθετηθεί στις οδοντικές επιφάνειες με καθαρό δάχτυλο ή πινέλο. Θα διατηρούσες περισσές ένδειξεις στα δόντια χρησιμοποιώντας βαμβακερά μεταξύτων καθαρισμό ή οδοντικό νήμα σχετικά με την κάθε GC Tooth Mousse.
2. Αφήστε το GC Tooth Mousse χωρίς ενόχληση πάνω στα δόντια για 3 λεπτά.
3. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη γλώσσα για να διασκορπίσετε την υπόλοιπη ποσότητα GC Tooth Mousse με όλο το στόμα. Κρατήστε το υλικό στο στόμα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (επτάλεπτα ~2 λεπτά) αποφεύγοντας την απορρόφηση ή καθαρσιρούντας την κατάποση. Όσο περισσότερο παραμένει το GC Tooth Mousse και το σάλιο στο στόμα τόσο αποτελεσματικότερη η διαδικασία.
4. Στη συνέχεια φτύστε και αν είναι δυνατόν αποφύγετε το ξέπλυμα. Κάθε περίσσεια του GC Tooth Mousse μπορεί να παραμείνει στις οδοντικές επιφάνειες να δεν αλλά σταδιακά. Μην φάτε ή πιείτε για 30 λεπτά μετά την εφαρμογή.

Για νύκτα τροφοπαθή μετά το βούρτσισμα των δοντιών σύμφωνα με τη συσταση από οδοντιατρο
1. Τοποθετήστε ικανοποιητική ποσότητα του υλικού GC Tooth Mousse στα άνω και κάτω δόντια. Η ελάχιστη ποσότητα υλικού που απαιτείται για κάθε οδοντικό τόξο πρέπει να είναι περίπου μία ερέβη, το υλικό πρέπει να τοποθετηθεί στις οδοντικές επιφάνειες με καθαρό δάχτυλο ή πινέλο. Θα διατηρούσες περισσές ένδειξεις στα δόντια χρησιμοποιώντας βαμβακερά μεσοδόντιου καθαρισμό ή οδοντικό νήμα σχετικά με την κάθε GC Tooth Mousse.
2. Αφήστε το GC Tooth Mousse χωρίς ενόχληση πάνω στα δόντια για 3 λεπτά.
3. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τη γλώσσα για να διασκορπίσετε την υπόλοιπη ποσότητα GC Tooth Mousse με όλο το στόμα. Κρατήστε το υλικό στο στόμα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (επτάλεπτα ~2 λεπτά) αποφεύγοντας την απορρόφηση ή καθαρσιρούντας την κατάποση. Όσο περισσότερο παραμένει το GC Tooth Mousse και το σάλιο στο στόμα τόσο αποτελεσματικότερη η διαδικασία.
4. Στη συνέχεια φτύστε και αν είναι δυνατόν αποφύγετε το ξέπλυμα. Κάθε περίσσεια του GC Tooth Mousse μπορεί να παραμείνει στις οδοντικές επιφάνειες να δεν αλλά σταδιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μην φάτε ή πιείτε για 30 λεπτά μετά την εφαρμογή.

ΓΕΥΣΕΙΣ
Φράουλα, Πεπόνι, Βανίλια, Μέντα, Tutti-Frutti

ΦΥΛΑΞΗ
Για άριστη απόδοση, φυλάξτε το υλικό σε δροσερό μέρος και βρού μέρος μακριά από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως (8–25°C, 46,4–77,0°F).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Σωληνάριο που περιέχει 40g (35ml.)
1. Ολεκτρόμενη συσκευασία
10 x 40g (2 του καθενός από κάθε γεύση Φράουλα, Πεπόνι, Βανίλια, Μέντα, Tutti-Frutti)
2. Συσκευασία μίας γεύσης
10 x 40g από κάθε γεύση Βανίλια, Φράουλα, Πεπόνι**, Tutti-Frutti**, Μέντα
**Διατίθεται μόνο στην ΕΥΡΩΠΗ
3. Ανταλλακτική συσκευασία
Συνάντρα 1 x 40g σε κάθε γεύση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το GC Tooth Mousse με τη μοναδική σύνθεση της ένωσης CPP-ACP σχεδιάστηκε στην Οδοντιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, Victoria Australia.
*RECALDENT, είναι κατατεθέν που χρησιμοποιείται με άδεια, Η τεχνολογία του CPP-ACP έχει κατοχυρώσεις πατέντες που εφαρμόζονται στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ευρώπη, Καναδά και Η.Π.Α.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Επανατοποθετήστε το καπάκι στο σωληνάριο μετά τη χρήση και αφαιρέστε υπολείμματα πάστας ή υγρασίας γύρω από το λαιμό του σωληνάριο ή μέσα από το καπάκι.
2. Σε περίπτωση επαφής του υλικού με τους οφθαλμούς ξεπλύνετε αμέσως με νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
3. Σε περίπτωση που το υλικό βρεθεί πάνω στα ρούχα, ξεπλύνετε με νερό.
4. Αν παρατηρηθούν συμπτώματα αγγειοοιδήματος μπορεί να είναι ένδειξη υπερευαισθησίας ή αλλεργίας σε βενζοϊκά παράγωγα ή σε άλλα συστατικά του προϊόντος, όπως ο παράγοντας δημιουργίας της γεύσης. Στην περίπτωση αυτή, διακόψτε τη χρήση του προϊόντος και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Κάποια από τα προϊόντα που αναφέρονται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης μπορεί να ταξινομηθούν ως επικίνδυνα σύμφωνα με το GHS. Εξοικειωθείτε με τις οδηγίες ασφαλείας που διατίθενται στο διαδίκτυο: http://www.gceurope.com/
Επίσης μπορείτε να τις παραλάβετε από τον προμηθευτή σας.

Τελευταία ανανέωση εκμετνου : 04/2018

Printed on: 10 May 2023

Tarkasta käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä. FI

GC Tooth Mousse™

PINNALLE ANNOSTELTAVA TAHNA, JOKA SISÄLTÄÄ BIOLOGISESTI SAATAVAA KALSIUMIA, FOSFAATTIA

Vain hammashoitoalan ammattilaisten käyttöön suositeltuihin indikaatioihin.

Kuvaus
GC Tooth Mousse on vesipohjainen pasta, joka sisältää RECALDENT™* (CPP-ACP: Casein Phosphopeptide–Amorphous Calcium Phosphate). Kun CPP-ACP annostellaan suuhun, se sitoutuu biofilmiin, plakkiin, bakteeriin hydroksiapatiittiin ja pehmeisiin kudoksiin paikallisiaen biologisesti saatavilla olevaa kalsiumia, fosfaatilla ja fluoridia.

Tärkeää
Sylki parantaa CPP-ACP:n tehoa,