Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

GC Ortho Connect™

LIGHT-CURED ORTHODONTIC ADHESIVE

For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE
1. Bonding metal brackets and attachments.
2. Bonding ceramic brackets.
3. Bonding plastic brackets and acrylic appliances.

CONTRAINDICATIONS
1. Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or methacrylate polymer.
2. Cementation of stainless steel crown-retained appliances (e.g., Herbst Appliances).

COMPOSITION
Dimethacrylate, silicon dioxide, barium glass, phosphoric acid ester monomer, initiator, pigment, stabilizer

DIRECTIONS FOR USE
A. TOOTH PREPARATION
1. Clean tooth surfaces to be bonded with pumice and water. Rinse thoroughly with water. Dry by gently blowing with an oil-free air.
2. Etch the tooth surface with GC Ortho Etching Gel 37% phosphoric acid for 30 seconds. Rinse thoroughly with water. Refer to the respective instructions for use.
3. Remove excess moisture by blowing with an oil-free air. Prepared surfaces should be dry.
NOTE:
If the surface to be bonded contains porcelain, composite, zirconia or metal, it should be treated accordingly. Porcelain and composite should be sandblasted and pre-treated with silane. Zirconia and metal should be sandblasted.
Refer to manufacturer's instructions.

B. BRACKET PREPARATION
Make sure that the bracket is pretreated and handled according to the manufacturer's instructions.

C. SYRINGE PREPARATION
1. Hold the syringe upright and remove the cap by turning counterclockwise.
2. Promptly and securely attach the dispensing tip to the syringe by turning clockwise.
3. Place the light protective cover until use.
NOTE:
Take care not to attach the dispensing tip too tightly.
This may damage its screw. In order to ensure a tight connection make sure that the threads are free of remnant material.



D. BONDING PROCEDURE
Brackets
1. Remove cover from the dispensing tip.
NOTE:
Prior to syringe material, make sure that the dispensing tip is securely attached to the syringe. Any possible air from the dispensing tip is removed by gently pushing forward the syringe plunger with the tip pointing upwards until material reaches the opening of the tip.
2. Slowly push the plunger to syringe material. If plugged, remove the dispensing tip and extrude a small amount of material directly from the syringe.
3. Coat the bonding surface of the bracket completely with the paste.
4. Position the coated bracket on the tooth.
5. Press the bracket firmly against the enamel surface. Using an explorer or a scaler, remove the excess adhesive at this time. Press the bracket again. Continue placing additional brackets. Place all brackets in a quadrant or in the full arch.
NOTE:
a. After removing excess adhesive, be careful not to disturb the brackets before the adhesive is cured. Movement of the brackets at this point might decrease the bond strength.
b. Minimize exposure to ambient light. Ambient light can shorten the manipulation time.
6. Light cure each bracket for 10 seconds each from the mesial and distal aspects with an LED light curing device (>500 mW/cm², 460-480 nm).
NOTE:
a. It is very important that the curing light be tested periodically with a light meter to ensure adequate light output.
b. Keep light guide as close as possible to the bonding and brackets.

Acrylic Appliances
1. Using a microetcher or a rotary instrument, roughen and place retention holes in the internal surfaces of the appliance.
2. Prepare the teeth as mentioned in section #1.
3. To facilitate removal of the appliance, place petroleum jelly on the occlusal surfaces of the teeth.
4. Fill the internal surfaces of the appliance with GC Ortho Connect.
5. Seat into proper position.
6. Immediately remove excessive adhesive from the periphery of the appliance.
7. Light-cure on the buccal, palatal and occlusal surfaces for 10 seconds each with an LED light curing device (>500 mW/cm², 460-480 nm).
8. Appliance activation can begin at the patient's bedtime the same evening.

E. DEBONDING PROCEDURE
Brackets
Grasp the bracket with a ligature cutter and, while supporting the tooth with fingers from the lingual side, give a sharp clockwise rotation to the bracket. If resistance is met, try again twisting in the opposite direction. Remove any residual adhesive with a rotary instrument.

Acrylic Appliances
To remove bonded appliances, flex the appliance in multiple sites with band removing pliers. If this does not remove the appliance, section the appliance and remove.

SHADE
Clear

STORAGE
Recommended for optimal performance, store at room temperature (4-25°C / 39.2-77.0°F) away from direct sunlight.

PACKAGE
2 x 2.9 g (2.0 mL) syringe,
4 x dispensing tip for GC Ortho Connect,
2 x light protective cover

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with cotton or a sponge soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or COCOA BUTTER can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. Take care to avoid ingestion of the material.
4. In case of contact with unintended areas of tooth or prosthetic appliances, remove with instrument, sponge or cotton pellet before light curing.
5. Do not use GC Ortho Connect in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder GC Ortho Connect from setting or bonding properly
6. Do not mix with other similar products.
7. The dispensing tips cannot be sterilized in an autoclave or chemiclave.
8. Do not wipe the dispensing tip with excessive alcohol as this may cause contamination of the material.
9. Wear plastic or rubber gloves during operation to avoid direct contact with air inhibited resin layers in order to prevent possible sensitivity.
10. Wear protective eye glasses during light curing.
11. When polishing the polymerized material, use a dust collector and wear a dust mask to avoid inhalation of cutting dust.
12. Avoid getting material on clothing.
13. Dispose of all wastes according to local regulations.
14. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.
15. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:
www.gc.dental/ortho
They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional / national guidelines.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us at Regulatory.gce@gc.dental

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 08/2024

CE 2797

MANUFACTURED by:
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

DISTRIBUTED by:
GC Orthodontics Europe GmbH
Harkortstrasse 2, 58339 Breckerfeld, Germany
www.gc.dental/ortho

22
PAP

PRINTED IN JAPAN

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба. BG

GC Ortho Connect™

СВЕТЛИННО ПОЛИМЕРИЗИРАЩ ОРТОДОНТСКИ АДХЕЗИВ

Да се използва само от дентални лекари, спазвайки инструкциите за употреба.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
1. Залепване на метални брекети и атачмънти.
2. Залепване на керамични брекети.
3. Залепване на пластмасови брекети и акрилни апарати.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Избягвайте употребата на този продукт при пациенти с известни алергии към метакрилатен мономер или метакрилатен полимер.
2. Циментиране на приспособления от неръждаема стомана свързани с коронка (напр. Herbst Appliances).

СЪСТАВ
Диметакрилат, силициев диоксид, бариево стъкло, мономер на естер на фосфорна киселина, инициатор, пигмент, стабилизатор

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА
А. ПОДГОТОВКА НА ЗЪБА
1. Почистете повърхностите, към които трябва да се свърже с пемза и вода. Изплакнете обилно с вода. Изсушете чрез лек въздушен поток без масло.
2. Ецвайте повърхността на зъба с GC Ortho Etching Gel 37% фосфорна киселина за 30 секунди. Изплакнете обилно с вода. Обърнете се към съответните инструкции за употреба.
3. Отстранете излишната влага чрез продухване с въздух без масло. Подготвените повърхности трябва да са сухи.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако повърхността за залепване съдържа порцелан, композит, цирконий или метал, тя трябва да се третира по съответния начин. Порцеланът и композитът трябва да бъдат пясъкоструйно обработени и предварително обработени със силан. Цирконият и металът трябва да бъдат пясъкоструйно обработени. Обърнете се към инструкциите на производителя.

Б. ПОДГОТОВКА НА БРЕКЕТИТЕ
Уверете се, че брекетът е предварително обработен и се борави в съответствие с инструкциите на производителя.

В. ПОДГОТОВКА НА ШПРИЦАТА
1. Дръжте шприца изправена и отстранете капачката, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка.
2. Бързо и сигурно прикрепете дозиращия накрайник към шприцата, като завъртите по посока на часовниковата стрелка.
3. Поставете светлинния защитен капак до употреба.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Внимавайте да не прикрепите накрайника за дозиране твърде плътно.
Това може да повреди винта му. За да осигурите плътна връзка, уверете се, че резбите са без остатъчен материал.



Г. ПРОЦЕДУРА НА СВЪРЗВАНЕ
Брекети
1. Отстранете капака от накрайника за дозиране.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Преди да поставите материала в шприцата, уверете се, че накрайникът за дозиране е здраво закрепен към шприцата. Всеки въздух въздух от дозиращия накрайник се отстранява чрез леко натискане напред на буталото на шприцата с върха, сочещ нагоре, докато материалът достигне отвора на накрайника.
2. Бавно натиснете буталото, за да вкарате материала в шприцата. Ако е запушен, отстранете накрайника за дозиране и инструктирайте малко количество материал директно от шприцата.
3. Покрийте напълно повърхността на брекета, към който се осъществява залепването с пастата.
4. Позиционирайте покрития с материал брекет върху зъба
5. Натиснете здраво брекета към повърхността на емайла. С помощта на експлорер или скалер, отстранете излишното лепило в този момент. Натиснете отново брекета. Продължете да поставяте останалите брекети. Поставете всички скоби в квадрант или в цялата дъга.
ЗАБЕЛЕЖКА:
a. След като отстраните излишното лепило, внимавайте да не преместите брекета, преди лепилото да е втвърдено. Движението на брекетите -в този момент може да намали здравината на връзката.
b. Минимизирайте излагането на околна светлина. Околната светлина може да съкрати времето за манипулация.
6. Светлинно полимеризирайте всеки брекет за 10 секунди всеки от медиалната и дистална страна с LED светлинно полимеризиращо устройство (>500 mW/cm², 460-480 nm).
ЗАБЕЛЕЖКА:
a. Много е важно полимеризационната лампа да се тества периодично със светломер, за да се осигури подходяща светлинна мощност.
b. Дръжте световода възможно най-близо до залепването и брекетите.

Акрилни апарати
1. С помощта на микроечър или ротационен инструмент награвавте и поставете отвори за задържане във вътрешните повърхности на апарата.
2. Подгответе зъбите, както е посочено в раздел #1.
3. За да улесните отстраняването на апарата, поставете вазелин върху оклузалните повърхности на зъбите.
4. Запълнете вътрешните повърхности на апарата с GC Ortho Connect.
5. Поставете в правилна позиция.
6. Незабавно отстранете излишното лепило от периферията на апарата.
7. Полимеризирайте върху букалните, палатиналните и оклузалните повърхности за 10 секунди всяка с LED полимеризиращо устройство (>500 mW/cm², 460-480 nm).
8. Активирането на апарата може да започне преди лягане на пациента същата вечер.

Е. ПРОЦЕДУРА НА ДЕБОНДИНГ
Брекети
Хванете брекета с инструмент за отрязване на лигатури и като поддържате зъба с пръсти от лингвалната страна, рязко завъртете брекета по посока на часовниковата стрелка. Ако срещнете съпротивление, опитайте отново да завъртите в обратната посока. Отстранете остатъчното лепило с ротационен инструмент.

Акрилен Апарат
За да премахнете залепени приспособления, огънете апарата на няколко места с клеща за премахване на пръстени. Ако това не премахне апарата, разрежете го и го извадете.

ЦВЯТ
Прозрачен

СЪХРАНЕНИЕ
Препоръчва се за оптимална работа да съхранявате при стайна температура (4-25°C / 39,2-77,0°F) далеч от пряка слънчева светлина.

ОПАКОВКА
2 x 2,9 g (2,0 mL) шприца,
4 x накрайник за дозиране за GC Ortho Connect,
2 x светлинно защитен капак

ВНИМАНИЕ
1. В случай на контакт с орална тъкан или кожа, отстранете незабавно с памук или гъба, напоена със спирт. Изплакнете с вода. За да се избегне контакт, може да се използва кофердам и/или COCOA BUTTER за изолиране на операционното поле от кожата или оралната тъкан.
2. В случай на контакт с очите, изплакнете незабавно с вода и потърсете медицинска помощ.
3. Внимавайте да избегнете поглъщането на материала.
4. В случай на контакт с нежелани участъци от зъби или протези, отстранете с инструмент, гъба или памучна топка преди светлинна полимеризация.
5. Не използвайте GC Ortho Connect в комбинация с материали, съдържащи евгенол, тъй като евгенолът може да попречи на правилното полимеризиране или свързване на GC Ortho Connect.
6. Да не се смесва с други подобни продукти.
7. Дозиращите накрайници не могат да бъдат стерилизирани в автоклав или в химиклав.
8. Не бършете накрайника за дозиране с много алкохол, тъй като това може да причини замърсяване на материала.
9. Носете пластмасови или гумени ръкавици по време на работа, за да избегнете директен контакт с въздушно инхибирани слоеве смола, за да предотвратите възможна чувствителност.
10. Носете защитни очила по време на светлинно втвърдяване.
11. Когато полирате полимеризирания материал, използвайте прахоуловител и носете маска за прах, за да избегнете вдишване на прах.
12. Избягвайте попадането на материал върху дрехите.
13. Изхвърлете всички отпадъци в съответствие с местните разпоредби.
14. В редки случаи продуктът може да предизвика чувствителност при някои хора. Ако се появят подобни реакции, преустановете употребата на продукта и се обърнете към лекар.
15. Винаги трябва да се носят лични предпазни средства (ЛПС), като ръкавици, маски за лице и предпазни очила.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност, налични на:
www.gc.dental/ortho
Те също така могат да бъдат изискани от Вашия доставчик.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ:
ДОЗИРАЩИ СИСТЕМИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кръстосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция. Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. Изхвърлете устройството, ако е увредено.
НЕ ПОТАПЯЙТЕ. Почистете добре устройството, за да се предотврати изсъхване и натрупване на замърсители. Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекциите средно ниво, регистриран за здравни цели, в зависимост от регионалните / националните указания.

За Резюме на безопасността и клиничното представяне (SSCP), моля, вижте базата данни EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) или се свържете с нас на Regulatory.gce@gc.dental

Докладване на нежелани ефекти:
Ако разберете за някакъв вид нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употребата на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за уведомяване, като изберете подходящия орган във Вашата страна достъпен чрез следната връзка:
hhttps://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en както и на нашата система за вътрешна бдителност: vigilance@gc.dental
По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция: 08/2024

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. CS

GC Ortho Connect™

SVĚTLEM TUHNOUCÍ ORTODONTICKÉ LEPIDLO

Určeno výhradně k použití ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

INDIKACE PRO POUŽITÍ
1. Lepení kovových zámečků a součástek.
2. Lepení keramických zámečků.
3. Lepení plastových zámečků a akrylátových součástí.

KONTRAINDIKACE
1. Vyhněte se použití tohoto produktu u pacientů se známou alergií na metakrylátový monomer nebo methakrylátový polymer.
2. Cementace nerezových korunkových součástí (např. Herbst Appliances).

SLOŽENÍ
Dimethakrylát, oxid křemičitý, baryové sklo, monomer esteru kyseliny fosforečné, iniciátor, pigment, stabilizátor

NÁVOD K POUŽITÍ
A. PREPARACE ZUBŮ
1. Očistěte povrch zubů, které mají být spojeny, pemzou a vodou. Důkladně opláchněte vodou. Sušte jemným foukáním vzduchem bez oleje.
2. Leptejte povrch zubu gelem GC Ortho Etching Gel 37% kyselinou fosforečnou po dobu 30 sekund. Důkladně opláchněte vodou. Viz příslušný návod k použití.
3. Odstraňte přebytečnou vlhkost foukáním vzduchu bez oleje. Připravené povrchy by měly být suché.
POZNÁMKA:
Pokud lepený povrch obsahuje keramiku, kompozit, oxid zirkoničitý nebo kov, měl by být odpovídajícím způsobem ošetřen. Keramika a kompozit by měly být opískovány a předem ošetřeny silanem. Oxid zirkoničitý a kov by měly být opískovány. Řiďte se pokyny výrobce.

B. PŘÍPRAVA ZÁMEČKŮ
Ujistěte se, že je zámeček předem ošetřen a je s ním zacházeno podle pokynů výrobce.

C. PŘÍPRAVA INJEKČNÍ STŘÍKAČKY
1. Držte injekční stříkačku ve svislé poloze a sejměte víčko otáčením proti směru hodinových ručiček.
2. Rychle a bezpečně připojte dávkovací hrot ke stříkačce otáčením ve směru hodinových ručiček.
3. Mějte nasazený ochranný kryt proti světlu až do chvíle použití.
POZNÁMKA:
Dávejte pozor, abyste dávkovací hrot nepřipevnili příliš pevně. Mohlo by tak dojít k poškození šroubu. Aby bylo zajištěno těsné spojení, ujistěte se, že závity jsou bez zbytků materiálu.



D. POSTUP LEPENÍ
Zámečky
1. Sejměte kryt z dávkovacího hrotu.
POZNÁMKA:
Před použitím materiálu stříkačky se ujistěte, že dávkovací hrot je bezpečně připevněn ke stříkačce. Veškerý případný vzduch z dávkovacího hrotu se odstraní jemným zatlačením pístu stříkačky dopředu tak, aby špička směřovala nahoru, dokud materiál nedosáhne otvoru špičky.
2. Pomalu zatlačte píst stříkačky. Pokud je ucpaná, vyjměte dávkovací hrot a vytlačte malé množství materiálu přímo ze stříkačky.
3. Část zámečku určenou k přilepení zcela potřete pastou.
4. Umístěte potřený zámeček na zub.
5. Zámeček pevně přitlačte ke sklovině. Pomocí sondy odstraňte přebytečné lepidlo. Znovu stiskněte zámeček. Pokračujte v umisťování dalších zámečků. Umístěte všechny zámečky do kvadrantu nebo do celého oblouku.
POZNÁMKA:
a. Po odstranění přebytečného lepidla dávejte pozor, abyste nenarušili zámečky před vytvrzením lepidla. Pohyb zámečků v tomto bodě může snížit pevnost spoje.
b. Minimalizujte dobu vystavení okolnímu světlu. Okolní světlo může zkrátit dobu manipulace.
6. Vytvrzujte každý zámeček po dobu 10 sekund z meziálního a distálního hlediska pomocí zařízení pro vytvrzovací lampy LED (>500 mW/cm², 460-480 nm).
POZNÁMKA:
a. It is very important that the curing light be tested periodically with a light meter to ensure adequate light output.
b. Udržujte lampu co nejblíže lepení a zámečkům.

Akrylový aparát
1. Pomocí mikroleptače nebo rotačního nástroje zdrsněte a umístěte retenční otvory do vnitřního povrchu aparátu.
2. Připravte zuby, jak je uvedeno v části #1.
3. Pro usnadnění vyjmutí aparátu umístěte vazelinu na okluzní plochy zubů.
4. Vyplňte vnitřní povrchy aparátu pomocí GC Ortho Connect.
5. Umístěte do správné polohy.
6. Ihned odstraňte přebytečné lepidlo z okraje aparátu.
7. Vytvrzujte světlem na bukálním, palatinálním a okluzním povrchu po dobu 10 sekund pomocí zařízení pro vytvrzování světlem LED (>500 mW/cm², 460-480 nm).
ZÁBELŽKA:
a. Mnoho e važno polimerizacionata lampa da ce testea periodično со светломер, за да се осигури подходяща светлинна мощност.
b. Дръжте световода възможно най-близо до залепването и брекетите.
8. Aktivace aparátu může začít před spaním pacienta tentýž večer.

E. POSTUP ODLEPENÍ
Zámečky
Uchopte zámeček cutterem a podepřete zub prsty z lingvální strany a ostře otáčejte ve směru hodinových ručiček zámečkem. Pokud narazíte na odpor, zkuste znovu otočit opačným směrem. Odstraňte zbytky lepidla rotačním nástrojem.

Akrylový aparát
Chcete-li odstranit spojený aparát, ohněte ho na více místech pomocí kleští na odstranění pásku. Pokud se tím aparát nevyjme, rozdělte jej a vyjměte.

ODSTÍN
Čistý

SKLADOVÁNÍ
Doporučeno pro optimální výkon, skladujte při pokojové teplotě (4-25°C / 39.2-77.0°F) mimo přímé sluneční světlo.

BALENÍ
2 x 2.9 g (2.0 mL) stříkačka,
4 x dávkovací hrot pro GC Ortho Connect,
2 x světlu ochranný kryt

UPOZORNĚNÍ
1. V případě kontaktu s ústní tkání nebo kůží okamžitě odstraňte vatou nebo houbou namočenou v alkoholu. Opláchněte vodou. Aby se zabránilo kontaktu, lze použít gumovou/nebo COCOA BUTTER k izolaci operačního pole od kůže nebo ústní tkáně.
2. V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
3. Dbejte na to, aby nedošlo k požití materiálu.
4. V případě kontaktu s nezamýšlenými oblastmi zubu nebo protetických aparátů jej před vytvrzením světlem odstraňte nástrojem, houbou nebo bavlnou.
5. Nepoužívejte GC Ortho Connect v kombinaci s materiály obsahujícími eugenol, protože eugenol může bránit správnému nastavení nebo lepení GC Ortho Connect.
6. Nemíchejte s jinými podobnými produkty.
7. Dávkovací hroty nelze sterilizovat v autoklávu nebo chemiklávě.
8. Dávkovací hrot neotírejte nadměrným množstvím alkoholu, protože by mohlo dojít ke kontaminaci materiálu.
9. Během provozu používejte plastové nebo gumové rukavice, abyste se vyhnuli přímému kontaktu se vzduchem inhibovanými vrstvami pryskyřice, aby se předešlo možné citlivosti.
10. Během vytvrzování světlem používejte ochranné brýle.
11. Při leštění polymerizovaného materiálu používejte savku a noste protiprachovou masku, aby nedošlo k vdechování řezného prachu.
12. Zabraňte kontaktu materiálu s oblečením.
13. Veškerý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
14. Ve vzácných případech může přípravek u některých lidí způsobit citlivost. Pokud se vyskytnou takové reakce, přestaňte přípravek používat a poraďte se s lékařem.
15. Vždy je třeba používat osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice, obličejové masky a ochranné brýle.

Některé výrobky, které jsou uváděné v návodu k použití, mohou být klasifikovány jako nebezpečné podle GHS. Vždy se seznamte s bezpečnostními listy, které jsou k dispozici na adrese:
www.gc.dental/ortho
Můžete je také získat u svého dodavatele.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE:
OPAKOVANĚ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACÍ SYSTÉMY: aby se zabránilo křížové kontaminaci mezi pacienty, vyžadují tyto dávkovací systémy střední úroveň dezinfekce. Dávkovací systém ihned po použití zkontrolujte a označte v případě pochybností. Znehodnoťte, pokud došlo k poškození dávkovacího systému.
DEZINFIKUJTE POUZE POVRCHOVĚ. Aby nedocházelo k zaschnutí a hromadění nečistot, dávkovací systém důkladně očistěte. Dezinfikujte produktem registrovaným pro střední úroveň dezinfekce dle místních zdravotních předpisů.

Souhrn bezpečnosti a klinických hodnocení (SSCP) naleznete v databázi EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) nebo nás kontaktujte na adrese Regulatory.gce@gc.dental

Hlášení nežádoucích účinků:
pokud obdržíte upozornění o jakémkoli nežádoucím účinku, reakci či podobných událostech, které jsou spojeny s používáním tohoto přípravku, a to včetně těch, které nejsou uvedeny v tomto návodu k použití, oznamte to přímo prostřednictvím příslušného systému hlášení nežádoucích účinků patřičnému úřadu ve vaší zemi, který je přístupný v následujícím odkazu:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en stejně jako našemu systému hlášení nežádoucích událostí: vigilance@gc.dental
Tímto způsobem přispějete ke zvýšení bezpečnosti tohoto produktu.

Naposledy revidováno: 08/2024

Prije uporabe pažljivo pročitati upute za uporabu. HR

GC Ortho Connect™

SVJETLOSNO POLIMERIZIRAJUĆI ORTODONTSKI ADHEZIV

Samo za stručnu dentalnu uporabu u indikacijama za uporabu.

INDIKACIJE
1. Postavljanje metalnih bravica i pričvrstaka.
2. Postavljanje keramičkih bravica.
3. Postavljanje plastičnih bravica i akrilatnih aparata.

KONTRAINDIKACIJE
1. Izbjegavati korištenje kod pacijenata alergičnih na metakrilatni monomer ili metakrilatni polimer.
2. Cementiranje aparata retiniranih krunicama iz nehrđajućeg čelika (npr. Herbst aparat).

SASTAV
Dimetakrilat, silicij dioksid, barijevo staklo, ester monomer fosforne kiseline, inicijator, pigment, stabilizator

UPUTE ZA UPORABU
A. PREPARACIJA ZUBA
1. Plovućcem i vodom očistiti površine zuba za postavljanje bravica. Temeljito isprati vodom. Osušiti laganim puhanjem bezuljnog zraka.
2. Jetkati površinu zuba GC Ortho Etching gelom 37%-tne fosforne kiseline 30 sekundi. Temeljito isprati vodom. Pridržavati se uputa za uporabu.
3. Ukloniti višak vlage puhanjem bezuljnim zrakom. Pripremljene površine trebaju biti suhe.
VAŽNO:
Ako površina za postavljanje bravica sadrži keramiku, kompozit, cirkonij-oksidnu keramiku ili metal, treba je odgovarajuće obraditi. Keramiku i kompozit treba pjeskariti i silanizirati. Cirkonij-oksidnu keramiku i metal treba pjeskariti. Pridržavati se uputa proizvođača.

B. PRIPREMA BRAVICA
Bravice pripremiti i rukovati njima sukladno uputama proizvođača.

C. PRIPREMA ŠTRCALJKE
1. Držati štrcaljku uspravno i skinuti poklopac okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Brzo i sigurno priključiti nastavak za doziranje na štrcaljku okretanjem u smjeru kazaljke na satu.
3. Do korištenja štrcaljku držati zatvorenu poklopcem za zaštitu od svjetla.
VAŽNO:
Paziti da se nastavak za doziranje ne zavije prečvrsto, jer to može oštetiti vijak. Provjeriti da na navoju nema ostataka materijala, kako bi se nastavak mogao dobro postaviti.

D. POSTUPAK LIJEPLJENJA
Bravice
1. Skinuti poklopac s nastavka za miješanje.
VAŽNO:
Prije ispiskivanja materijala, provjeriti da je nastavak za doziranje čvrsto pričvršćen na štrcaljku. Ako u nastavku za doziranje ima zraka, valja ga otkloniti laganim pritiskom klipa štrcaljke prema naprijed s vrhom okrenutim prema gore dok materijal ne dođe do otvora nastavka.
2. Polako pritisnuti klip za istiskivanje materijala. Ako je začepljen, skinuti nastavak za doziranje i istisnuti malu količinu materijala direktno iz štrcaljke.
3. Površinu za ljepljenje bravice potpuno premazati pastom.
4. Premazanu bravicu postaviti na zub.
5. Čvrsto pritisnuti bravicu uz površinu cakline. Sondom ili strugačem ukloniti višak adheziva. Ponovno pritisnuti bravicu. Nastaviti postavljati ostale bravice. Postaviti sve bravice u kvadrantu ili u punom zubnom luku.
VAŽNO:
a. Nakon uklanjanja viška adheziva, paziti da se bravice ne pomaknu prije nego se adhezivi stvrdne. Pomicanje bravica u ovom trenutku može smanjiti čvrstoću spajanja.
b. Maksimalno smanjiti izloženost okolnom svjetlu. Okolno svjetlo može skratiti vrijeme rukovanja.
6. Svaku bravicu polimerizirati 10 sekundi s mezijalne i distalne strane LED svjetlom za polimerizaciju (>500 mW/cm², 460-480 nm).
VAŽNO:
a. Vrlo je važno da se svjetlo za polimerizaciju povremeno testira svjetlomjerom, kako bi se osigurala potrebna izlazna svjetlosna jakost.
b. Vodilicu za svjetlo držati što je moguće bliže mjestu postavljanja i bravicama.

Akrilatni aparati
1. Mikrojetkanom ili rotirajućim instrumentom ohrapaviti površinu i postaviti retencijske rupe u unutarnjim površinama aparata.
2. Pripremiti zube kako je navedeno pod 1.
3. Za lakše skidanje aparata, na okluzalne površine zuba nanijeti vazelin.
4. Ispuniti unutarnje površine aparata s GC Ortho Connect.
5. Postaviti u pravilan položaj.
6. Odmah odstraniti višak adheziva s ruba aparata.
7. Svjetlosno polimerizirati bukalnu, palatinalnu i okluzalnu površinu po 10 sekundi LED svjetlom za polimerizaciju (>500 mW/cm², 460-480 nm).
8. Aktivacija aparata može započeti u vrijeme pacijentovog spavanja iste večeri.

E. SKIDANJE BRAVICA I APARATA
Bravice
Obuhvatiti bravicu kliještima za rezanje ligature i držeći zub prstima s lingvalne strane oštro zarotirati bravicu u smjeru kazaljke na satu. Ako se javi otpor, pokušati ponovno okrenuti u suprotnom smjeru. Ukloniti ostatke adheziva rotirajućim instrumentom.

Akrilatni aparati
Za uklanjanje aparata, saviti ga na više mjesta pomoću klješta za skidanje ortodontskih traka. Ako ga se tako ne uspije skinuti, treba ga razrezati i odstraniti.

BOJA
Prozirna

ČUVANJE
Za najbolje rezultate preporuča se čuvanje na sobnoj temperaturi (4-25°C) daleko od direktne sunčeve svjetlosti.

PAKIRANJE
2 x 2,9 g (2,0 ml) štrcaljka,
4 x nastavak za doziranje za GC Ortho Connect
2 x poklopac za zaštitu od svjetla

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira s oralnim tkivom ili kožom, odmah ukloniti vatom ili spužvicom namočenom u alkohol. Isprati vodom. Za izbjegavanje dodira koristiti koferdam i/ili COCOA BUTTER za izolaciju radnog polja od kože ili oralnog tkiva.
2. U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti liječnika.
3. Ne gutati materijal.
4. U slučaju dodira s neželjenim dijelovima zuba ili protezama, materijal odstraniti instrumentom, spužvicom ili vatom prije svjetlosne polimerizacije.
5. Ne koristiti GC Ortho Connect u kombinaciji s materijalima koji sadrže eugenol, budući da eugenol može spriječiti pravilno stvrdnjavanje ili spajanje adheziva GC Ortho Connect.
6. Ne miješati s drugim sličnim proizvodima.
7. Nastavci za doziranje ne mogu se sterilizirati u autoklavu ili kemiklavu.
8. Ne brisati nastavak za doziranje s puno alkohola, jer se time može kontaminirati materijal.
9. Nositi plastične ili gumene rukavice tijekom rada kako bi se izbjegao direktan dodir sa smolastim slojevima inhibicije polimerizacije kisikom i time spriječila moguća preosjetljivost.
10. Nositi zaštitne naočale tijekom svjetlosne polimerizacije.
11. Pri poliranju polimeriziranog materijala koristiti sakupljač prašine i nositi masku za zaštitu od prašine kako bi se izbjeglo udisanje prašine od brušenja.
12. Izbjegavati dodir materijala s odjećom.
13. Otpad zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.
14. U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osjetljivost kod nekih osoba. U slučaju pojave takve reakcije, prekinuti uporabu proizvoda i potražiti liječnika.
15. Uvijek nositi osobna zaštitna sredstva (Personal Protective Equipment - PPE), kao što su rukavice, maske za lice i zaštitne naočale.

Neki proizvodi navedeni u ovim uputama mogu biti svrstani u opasne sukladno Globalno usklađenom sustavu razvrstavanja i označavanja kemikalija (GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Uvijek je potrebno upoznati se sa sigurnosno-tehničkim listovima materijala dostupnim na:
www.gc.dental/ortho
Mogu se nabaviti i od dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:
VIŠEKRATNO UPOTREBLJIVA PAKIRANJA: kako bi se izbjeglo unošćenje između pacijenata ovi sustavi zahtijevaju upotrebljivi predmeti zahtijevaju dezinfekciju srednje razine. Odmah nakon uporabe pregledati viškeratno upotrebljivi predmet kako bi se otkrilo eventualno oštećenje. Odbaciti oštećeni odbadit.
NE URANJATI U TEKUĆE SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU. Temeljito očistiti viškeratno upotrebljivi predmet kako bi se spriječilo sušenje i nakupljanje onečišćenja. Dezinficirati sredstvom za dezinfekciju srednje razine prema registriranoj zdravstveno-infektivnoj kontroli sukladno regionalnom/nacionalnim smjernicama.

Za Sažetak sigurnosti i kliničke učinkovitosti (Summary of Safety and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Izvješćivanje o neželjenim učincima:
Ako postanete svjesni bilo kakvih neželjenih učinaka, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo uporabom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za uporabu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sustav nadzora, odabirom odgovarajućeg autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sljedeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en kao i na naš interni sustav nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinijeti poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Datum zadnje revizije: 08/2024

Használat előtt az útmutatót olvassa el figyelmesen! HU

GC Ortho Connect™

FÉNYRE KEMÉNYEDŐ FOGSZABÁLYozó FOGÁSZAT SZEMÉLYZETNEK

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasolj

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie. SK

GC Ortho Connect™

SVETLOM TUHNÚCE ORTODONTICKÉ ADHEZÍVUM

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

ODPORÚČANÉ INDIKÁCIE
1. Bondovanie kovových zámkov a attachmentov.
2. Bondovanie keramických zámkov.
3. Bondovanie plastových zámkov a akrylových aparátov (strojčekov).

KONTRAINDIKÁCIE
1. Nepoužívajte tento produkt u pacientov so známou alergiou na skloionomérny cement, metakrylátový monomér alebo metakrylátový polymér.
2. Fixácia aparátov z antikorovej ocele ukotvených na korunkách (napr. Herbstove).

ZLOŽENIE
Dimetakrylát, oxid kremičitý, bárnaté sklo, monomér esteru kyseliny fosforečnej, iniciátor, pigment, stabilizátor

NÁVOD NA POUŽITIE
A. PRÍPRAVA ZUBA
   1. Povrchy zubov určených na fixáciu očistite pemzou a vodou. Dôkladne opláchnite vodou a jemne osušte prúdom vzduchu bez prímesi oleja.
   2. Povrchy zubov naleptajte leptacím gélom GC Ortho Etching Gel 37% kyselinou fosforečnou po dobu 30 sekúnd. Dôkladne opláchnite vodou. Pozrite si príslušný návod na použitie.
   3. Odstráňte prebytočnú vlhkosť fúkaním vzduchu bez obsahu oleja. Pripravené povrchy by mali byť suché.
   POZNÁMKA:
   Ak povrch určený na fixáciu je z porcelánu, zirkónovej keramiky alebo kovu, postupujte nasledovne: porcelán a kompozit treba opieskovať a predošetriť silanom, zirkónovú keramiku a kov treba opieskovať. Riaďte sa pokynmi výrobcu.
B. PRÍPRAVA ORTODONTICKÝCH ZÁMKOV
   Ubezpečte sa, že zámky boli riadne predbežne ošetrené a manipulácia s nimi prebehla podľa pokynov výrobcu.
C. PRÍPRAVA STRIEKAČKY
   1. Držte striekačku v zvislej polohe a odstráňte uzáver otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
   2. Okamžite a bezpečne pripojte koncovku k striekačke otáčaním v smere hodinových ručičiek.
   3. Nasaďte ochranný kryt svetla až do použitia.
   POZNÁMKA:
   Dávajte pozor, aby ste koncovku nepripevnili príliš tesne. Môže to poškodiť závit. Aby ste zaistili tesné spojenie, uistite sa, že závity sú bez zvyškov materiálu.

D. POSTUP LEPENIA
Zámky (Brackets)
   1. Odstráňte kryt z dávkovacej špičky.
   POZNÁMKA:
   Pred vytlačením materiálu zo striekačky sa uistite, že dávkovacia špička je bezpečne pripevnená k striekačke. Akýkoľvek možný vzduch z dávkovacej špičky sa odstráni jemným zatlačením prestu striekačky smerom dopredu, pričom špička smeruje nahor, kým materiál nedosiahne otvor špičky.
   2. Pomaly zatlačte piest na materiál v striekačke. Ak je upchatý, odstráňte dávkovací hrot a vytlačte malé množstvo materiálu priamo zo striekačky.
   3. Na celú lepiacu plochu zámky aplikujte materiál.
   4. Umiestnite zámku na zub.
   5. Zámku pevne pritlačte k povrchu skloviny. Pomocou nástroja explorer alebo scalera odstráňte prebytočné adhezívne hmoty okolo zámok. Pokračujte v umiestňovaní ďalších zámkov. Všetky zámky umiestnite do kvadrantu alebo do úplného oblúka.
   POZNÁMKA:
   a. Po odstránení prebytočného adhezíva dávajte pozor, aby ste neporušili zámky pred vytvrdnutím lepidla. Pohyb zámkov v tomto bode môže znížiť pevnosť spoja.
   b. Minimalizujte vystavenie okolitému svetlu. Okolité svetlo môže skrátiť čas manipulácie.
   6. Každý zámok vytvrdzujte svetlom po 10 sekúnd z meziálnej a distálnej strany pomocou LED polymerizačnej lampy (>500 mW/cm², 460-480 nm).
   POZNÁMKA:
   a. Je veľmi dôležité, aby sa polymerizačné svetlo pravidelne testovalo pomocou merača intenzity svetla, aby sa zabezpečil primeraný svetelný výkon.
   b. Svetlovod umiestnite čo najbližšie k lepeniu a zámkom.

Akrylové aparáty (strojčeky)
   1. Pomocou mikroleptacej alebo rotačného brúsika vybrúste upevňovacie otvory na vnútorných plochách strojčeka.
   2. Pripravte zuby tak, ako je uvedené v časti #1.
   3. Na ufančenie odstránenia strojčeka z čist naneste vazelínu na okluzálne povrchy zubov.
   4. Na vnútorné plochy strojčeka naneste GC Ortho Connect.
   5. Nasaďte do správnej polohy.
   6. Okamžite odstráňte prebytočné lepidlo z okrajov strojčeka.
   7. Vytvrdzujte svetlom na bukálnom, palatinovom a okluzálnom povrchu po dobu 10 sekúnd pomocou LED polymerizačnej lampy (>500 mW/cm², 460-480 nm).
   8. Aktivácia strojčeka môže začať pred spaním pacienta v ten istý večer.
E. POSTUP PRI ODSTRAŇOVANÍ
Zámkov (Breckets)
Držiak zámku uchopte ligatúrnymi kliešťami a za súčasného podopierania zuba prstami z lingválnej strany zámok prudko otočte v smere hodinových ručičiek. Ak narazíte na odpor, skúste to znova otočiť v opačnom smere. Odstráňte zvyšky lepidla pomocou rotačného nástroja.

Akrylové aparáty (strojčeky)
Ak chcete odstrániť lepené strojčeky, ohýbajte strojček na viacerých miestach pomocou kliešťi na odstraňovanie krúžkov. Ak sa tým strojček neodstráni, rozdeľte ho na časti a vyberte ho.

ODTIEŇ
Clear (priesvitný)

SKLADOVANIE
Pre zachovanie optimálnych fyzikálnych vlastností sa odporúča skladovať pri izbovej teplote (4-25°C / 39,2-77,0°F) mimo priameho slnečného svetla.

BALENIE
2 x 2,9 g (2,0 ml) striekačka
4 x dávkovacie koncovky pre GC Ortho Connect,
2 x svetelné ochranné kryty

UPOZORNENIA
1. V prípade zasiahnutia sliznice úst alebo pokožky ihneď odstráňte hubkou alebo kúskom vaty namočeným v alkohole. Opláchnite vodou. Aby ste zamedzili kontaktu, operované miesto môžete izolovať od pokožky alebo sliznice úst pomocou koferdamu a/alebo COCOA BUTTER.
2. V prípade zasiahnutia očí ihneď vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
3. Dávajte pozor, aby ste materiál neprehltli.
4. V prípade kontaktu s nežiaducimi oblasťami zuba alebo protetických povrchov odstráňte pred vytvrdzovaním svetlom pomocou nástroja, špongie alebo vatovej tyčinky.
5. GC Ortho Connect nepoužívajte v kombinácii s materiálmi s obsahom eugenolu, keďže eugenol môže spôsobiť nedostatočné tuhnutie alebo väzbu s GC Ortho Connect.
6. Nemiešajte s inými podobnými produktmi.
7. Dávkovacie koncovky nie je možné sterilizovať v autokláve alebo v chemikálov.
8. Dávkovaciu koncovku neutierajte nadmerným množstvom alkoholu, pretože to môže spôsobiť kontamináciu materiálu.
9. Počas používania materiálu noste plastové alebo gumené rukavice, aby ste sa vyhli priamemu kontaktu s vrstvami živice inhibovanej vzduchom, aby ste predišli možnej citlivosti.
10. Počas vytvrdzovania svetlom používajte ochranné okuliare.
11. Pri lešteni polymerizovaného materiálu používajte odsávačku a noste ochrannú masku, aby ste zabránili vdýchnutiu brúsneho prachu.
12. Zabráňte kontaktu materiálu s odevom.
13. Všetok odpad zlikvidujte podľa miestnych predpisov.
14. V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť u niektorých osôb precitlivenosť. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.
15. Vždy používajte osobné ochranné prostriedky (OOP) ako sú rukavice, masku a ochranné okuliare.

Niektoré produkty uvedené v tomto návode na použitie môžu byť podľa GHS klasifikované ako nebezpečné. Vždy sa oboznámte s kartami bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na:
www.gc.dental/ortho
Môžete o ne tiež požiadať svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA:
OPAKOVANÉ POUŽÍVANÉ DÁVKOVACIE POMÔCKY: aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi pacientmi potrebujú tieto dávkovacie pomôcky stredný úroveň dezinfekcie. Ihneď po použitím ich skontrolujte a označte v prípade pochybností. Ak boli poškodené, zlikvidujte ich.
NEPONÁRAJTE. Aby nedochádzalo k zasychaniu a hromadeniu nečistôt dávkovaciu pomôcku dôkladne vyčistite. Dezinfikujte s registrovanými zdravotníckymi dezinfekčnými prostriedkami na stredný úrovni dezinfekcie podľa regionálnych / národných smerníc.

Súhrn bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) nájdete v databáze EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) alebo nás kontaktujte na adrese Regulatory.gce@gc.dental

Hlásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiadúce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance systém, zadaním správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
ako aj na našom vnútornom systéme bdelosti: vigilance@gc.dental
Týmto spôsobom prispejete k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Dátum poslednej opravy: 08/2024

Pred uporabo previdno preberite navodila za uporabo. SL

GC Ortho Connect™

SVETLOBNO STRJUJOČE ORTODONTSKO LEPILO

Samo za profesionalno dentalno uporabo.

INDIKACIJE ZA UPORABO
1. Lepljenje kovinskih bretetov in nastavkov.
2. Lepljenje keramičnih bretetov.
3. Lepljenje plastičnih bretetov in akrilnih aparatov.

KONTRAINDIKACIJE
1. Izogibajte se uporabi tega izdelka pri bolnikih z znanimi alergijami na metakrilatni monomer ali metakrilatni polimer.
2. Cementiranje elementov iz nerjavečega jekla s krono (npr. Herbst aparat).

SESTAVA
Dimetakrilat, silicijev dioksid, barijumovo staklo, ester monomer ortofosforne kiseline, inicijator, pigment, stabilizator

NAVODILA ZA UPORABO
A. PRIPRAVA ZOBA
   1. Zobne površine, ki jih želite lepiti, očistite s plovcem in vodo. Temeljito speprite z vodo. Posušite z nežnim pihanjem z zrakom brez olja.
   2. Jedkajte površino zoba z GC Ortho Etching Gel 37% fosforne kisline 30 sekund. Temeljito speprite z vodo. Glejte ustrezna navodila za uporabo.
   3. Odstranite odvečno vlago s pihanjem z zrakom brez olja. Pripravljene površine morajo biti suhe.
   OPOMBA:
   Če površina, ki jo želite lepiti, vsebuje porcelan, kompozit, cirkonij ali kovino, jo je treba ustrezno obdelati. Porcelan in kompozit morata biti peskana in predhodno obdelana s silanom. Cirkonij in kovino je treba peskati. Glejte navodila proizvajalca.
B. PRIPRAVA BREKETOV
   Prepričajte se, da je breket predhodno obdelan in z njim ravnate v skladu z navodili proizvajalca.
C. PRIPRAVA BRIZGE
   1. Držite brizgo pokonci in odstranite pokrovček tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca.
   2. Takoj in varno priključite dozirno konico na brizgo tako, da jo zavrtite v smeri urinega kazalca.
   3. Do uporabe namestite zaščitni pokrov za svetlobo.
   OPOMBA:
   Pazite, da dozirne konice ne pritrdite pretesno.
   To lahko poškoduje vijak. Da bi zagotovili lesno povezavo, se prepričajte, da na navojih ni ostankov materiala.



D. POSTOPEK CEMENTIRANJA
Breketi
   1. Odstranite pokrov z dozirne konice.
   OPOMBA:
   Pred cementiranjem se prepričajte, da je dozirna konica varno pritrjena na brizgo. Morebitni zrak iz dozirne konice odstranite tako, da bat brizge nežno potisnete naprej s konico, obrnjeno navzgor, dokler material ne doseže odprtine konice.
   2. Počasi potisnite bat na material brizge. Če je zamašen, odstranite dozirno konico in iztisnite majhno količino materiala neposredno iz brizge.
   3. Cementirano površino premažite v celoti premažite s pasto.
   4. Pripravljen breket namestite na zob.
   5. Trdno pritisnite breket ob površino sklenine. S pomočjo sklepa explorer odstranite odvečen cement. Ponovno pritisnite breket. Nadaljujte z namestitvijo dodatnih bretekov. Postavite vse brekete v kvadrant ali v polni lok.
   OPOMBA:
   a. Po odstranitve odvečen cement pazite, da ne poškodujete bretekov, preden se cement strdi. Premik bretekov na tej točki lahko zmanjša moč vezave.
   b. Zmanjšajte izpostavljenost ambientalni svetlobi. Ambientalna svetloba lahko skrajša čas manipulacije.
   6. Svetlobno polimerizirajte vsak breket 10 sekund z mezialne in distalne strani z LED svetlobno polimerizacijsko napravo (>500 mW/cm², 460-480 nm).
   OPOMBA:
   a. Zelo pomembno je, da se polimerizacijska lučka redno testira s svetlobnim merilcem, da se zagotovi ustrezna svetlobna moč.
   b. Svetlobni vodnik naj bo čim bližje cementu in breketom.

Akrilni aparati
   1. Z mikrojedkalnikom ali rotacijskim instrumentom nahrapavite in nanesite retencijske luknje v notranje površine strojčka.
   2. Pripravite zobe, kot je navedeno v razdelku #1.
   3. Za lažjo odstranitev aparata nanesite vazelin na okluzalne površine zob.
   4. Notranje površine aparata napolnite z GC Ortho Connect.
   5. Postavite v pravilen položaj.
   6. Takoj odstranite odvečen cement z obrobja aparata.
   7. Svetlobno polimerizirajte na bukalni, palatinalni in okluzalni površini 10 sekund vsako z LED svetlobno polimerizacijsko napravo (>500 mW/cm², 460-480 nm).
   8. Aktivacija aparata se lahko začne ob pacientovem spanju isti večer.
E. POSTOPEK ODCEMENTIRANJA
Breketi
Primite breket s kleščami za ligaturo in medtem ko s prsti podpirate zob z lingvalne strani, ostro zavrtite breket v smeri urinega kazalca. Če zaznate upor, poskusite znova zasukati v nasprotno smer. Odstranite ostanke cementa z vrtljivim instrumentom.

Akrilni aparati
Za odstranitev zleplienih aparatov, aparat upognite na več mestih s kleščami za odstranjevanje traku. Če s tem ne odstranite aparata, ga razrežite in odstranite.

BARVA
transparentna

SHRANJEVANJE
Za optimalno delovanje priporočamo shranjevanje pri sobni temperaturi (4–25°C / 39,2–77,0°F) stran od neposredne sončne svetlobe.

PAKIRANJE
2 x 2,9 g (2,0 ml) injekcijska brizga,
4 x dozirna konica za GC Ortho Connect,
2 x lahka zaščitna prevleka

POZOR
1. V primeru stika z ustnim tkivom ali kožo takoj odstranite z vato ali gobico, namočeno v alkohol. Speríte z vodo. Da preprečite stik, lahko uporabite gumijasto opno in/ali COCOA BUTTER, da izolirate operacijsko polje od kože ali ustnega tkiva.
2. V primeru stika z očmi takoj sperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč.
3. Pazite, da materiala ne zaužijete.
4. V primeru stika z neprevidnemi območji zoba ali protetičnih pripomočkov, odstranite z instrumentom, gobico ali vato pred svetlobno polimerizacijo.
5. GC Ortho Connect ne uporabljajte v kombinaciji z materiali, ki vsebujejo eugenol, budući da eugenol može spriječiti pravilno stvrdnjavanje ili spajanje adheziva GC Ortho Connect.
6. Ne mešati sa drugim sličnim proizvodima.
7. Nastavci za doziranje se ne mogu sterilisati u autoklavu ili hemiklavu.
8. Ne brisati nastavak za doziranje sa puno alkohola, jer se time može kontaminirati materijal.
9. Nosiť plastične ili gumene rukavice tokom rada kako bi se izbegao direktan dodir sa smolastim slojevima inhibicije polimerizacije kiseonikom i time sprečila moguća preosetljivost.
10. Nositi zaštitne naočare tokom svetlosne polimerizacije.
11. Pri poliranju polimerizovanog materijala koristiti sakupljač prašine i nositi masku za zaštitu od prašine kako bi se izbeglo udisanje prašine od brušenja.
12. Izbegavati dodir materijala sa odećom.
13. Otpad zbrinuti u skladu sa lokalnim propisima.
14. U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osetljivost kod nekih osoba. U slučaju pojave takve reakcije, prekinuti upotrebu proizvoda i potražiti lekara.
15. Uvek nositi ličnа zaštitna sredstva (Personal Protective Equipment - PPE), kao što su rukavice, maske za lice i zaštitne naočare.

Neki proizvodi navedeni u ovim uputstvima mogu biti svrstani u opasne u skladu sa Globalno usklađenom sistemu razvrstavanja i označavanja hemikalija (GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Uvek je potrebno upoznati se sa sigurnosno-tehničkim listovima materijala dostupnim na:
www.gc.dental/ortho
Mogu se nabaviti i od dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:
SISTEM ZA VIŠEKRATNO DOZIRANJE: za izbegavanje međusobne kontaminacije između pacijenata, ovaj uređaj zahteva srednji nivo dezinfekcije. Odmah nakon upotrebe proveriti uređaj i označiti ga ako su mu svojstva umanjena. U slučaju oštećenja uređaj baciti.
NE URANJATI U VODU. Uređaj detaljno očistiti kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje ostataka materijala. Dezinfikovati ga registrovanim sredstvom za srednji nivo kontrole infekcije u zdravstvu u skladu sa regionalnim / nacionalnim propisima.

Za rezime sigurnosti i kliničkog učinka (Summary of Safety and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, odabirom odgovarajuće autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Datum zadnje revizije: 08/2024

Пред употребата разбирно прочетете упутство. SR

GC Ortho Connect™

SVETLOSNO POLIMERIZUJUĆI ORTODONTSKI ADHEZIV

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u indikacijama za upotrebu.

INDIKACIJE
1. Postavljanje metalnih bravica i atačmena.
2. Postavljanje keramičkih bravica.
3. Postavljanje plastičnih bravica i akrilatnih aparata.

KONTRAINDIKACIJE
1. Izbegavati korišćenje kod pacijenata alergičnih na metakrilatni monomer ili metakrilatni polimer.
2. Cementiranje aparata retiniranih krunicama od nerđajuće čelika (npr. Herbst aparat).

SASTAV
Dimetakrilat, silicijum dioksid, barijumovo staklo, ester monomer ortofosforne kiseline, inicijator, pigment, stabilizator

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
A. PREPARACIJA ZUBA
   1. Abrazivnom pastom i vodom očistiti površine zuba za postavljanje bravica. Detaljno isprati vodom. Osušiti laganim duvanjem bezuljnog vazduha.
   2. Nagrizati površinu zuba GC Ortho Etching gelom 37%-tne ortofosforne kiseline 30 sekundi. Detaljno isprati vodom. Pridržavati se uputstva za upotrebu.
   3. Ukloniti višak vlage duvanjem bezuljnim vazduhom. Preparisane površine trebaju da budu suve.
   VAŽNO:
   Ako površina za postavljanje bravica sadrži keramiku, kompozit, cirkonijum-oksidnu keramiku ili metal, treba je odgovarajuće obraditi. Keramiku i kompozit treba peskirati i silanizirati. Cirkonijum-oksidnu keramiku i metal treba peskirati. Pridržavati se uputstva proizvođača.
B. PRIPREMA BRAVICA
   Bravice pripremiti i rukovati njima u skladu sa uputstvom proizvođača
C. PRIPREMA ŠPRICA
   1. Špric držati uspravno i skinuti poklopac okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
   2. Brzo i sigurno pričvrstiti nastavak za doziranje na špric okretanjem u smeru kazaljke na satu.
   3. Do korišćenja špric držati zatvoren poklopcem za zaštitu od svetla.
   VAŽNO:
   Paziti da se nastavak za doziranje ne zavije prečvrsto, jer to može oštetiti navoj. Proveriti da na navoju nema ostataka materijala, kako bi se nastavak mogao dobro postaviti.



D. POSTAVLJANJE
Bravice
   1. Skinuti poklopac sa nastavka za doziranje.
   VAŽNO:
   Pre istiskivanja materijala, proveriti da je nastavak za doziranje čvrsto pričvršćen na špric. Ako u nastavku za doziranje ima vazduha, treba ga otkloniti laganim pritiskom klipa šprica prema napred sa vrhom okrenutim prema gore dok materijal ne dođe do otvora nastavka.
   2. Polako pritisnuti klip za istiskivanje materijala. Ako je začepljen, skinuti nastavak za doziranje i istisnuti malu količinu materijala direktno iz šprica.
   3. Površinu za lepljenje bravice potpuno premazati pastom.
   4. Premazanu bravicu postaviti na zub.
   5. Čvrsto pritisnuti bravicu na površinu gleđi. Sondom ili strugačem ukloniti višak adheziva. Pravilno pritisnuti bravicu. Nastaviti sa postavljanjem ostalih bravica. Postaviti sve bravice u kvadrantu ili u punom zubnom luku.
   VAŽNO:
   a. Nakon uklanjanja viška adheziva, paziti da se bravice ne pomere pre nego se adhezivi stvrdne. Pomeranje bravica u ovom trenutku može smanjiti čvrstoću spajanja.
   b. Maksimalno smanjiti izloženost okolnom svetlu. Okolno svetlo može skratiti vreme rukovanja.
   6. Svaku bravicu polimerizovati 10 sekundi sa mezijalne i distalne strane LED svetlom za polimerizaciju (>500 mW/cm², 460-480 nm).
   VAŽNO:
   a. Vrlo je važno da se svetlo za polimerizaciju povremeno testira svetliomerom, kako bi se osigurala potrebna jačina izlaznog svetla.
   b. Vodič za svetlo držati što je moguće bliže mestu postavljanja i bravicama.

Akrilatni aparati
   1. Mikroanganjem ili rotirajućim instrumentom ohrapaviti površinu i napariti retencione rupe u unutrašnjim površinama aparata.
   2. Priparisati zube kako je navedeno pod 1.
   3. Za lakše skidanje aparata, na okluzalne površine zuba naneti vazelin.
   4. Ispuniti unutrašnje površine aparata sa GC Ortho Connect.
   5. Postaviti u pravilan položaj.
   6. Odmah ostraniti višak adheziva sa rubova aparata.
   7. Svetlosno polimerizovati bukalnu, palatinalnu i okluzalnu površinu po 10 sekundi LED svetlom za polimerizaciju (>500 mW/cm², 460-480 nm).
   8. Aktivacija aparata može započeti u vreme pacijentovog spavanja iste večeri.
E. SKIDANJE BRAVICA I APARATA
Bravice
Obuhvatiti bravicu kliještima za rezanje ligature i držeći zub prstima sa lingvalne strane oštro zarotirati bravicu u smeru kazaljke na satu. Ako se javi otpor, pokušati ponovo okretanjem u suprotnom smeru. Ukloniti ostatke adheziva rotirajućim instrumentom.

Akrilatni aparati
Za uklanjanje aparata, saviti ga na više mesta pomoću klešta za skidanje ortodontskih traka. Ako se tako ne uspe sa skidanjem, treba ga razrezati i odstraniti.

BOJA
Prozirna

ČUVANJE
Za najbolje rezultate preporučuje se čuvanje na sobnoj temperaturi (4-25°C) daleko od direktne sunčeve svetlosti.

PAKOVANJE
2 x 2,9 g (2,0 ml) špric,
4 x nastavak za doziranje za GC Ortho Connect
2 x poklopac za zaštitu od svetla

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira sa oralnim tkivom ili kožom, odmah ukloniti vatom ili sunđerom namočenom u alkohol. Isprati vodom. Za izbegavanje dodira koristiti koferdam i/ili COCOA BUTTER za izolaciju radnog polja od kože ili oralnog tkiva.
2. U slučaju dodira sa očima, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
3. Ne gutati materijal.
4. U slučaju dodira sa neželjenim delovima zuba ili protezama, materijal odstraniti instrumentom, sunđerom ili vatom pre svetlosne polimerizacije.
5. Ne koristiti GC Ortho Connect u kombinaciji sa materijalima koji sadrže eugenol, budući da eugenol može spriječiti pravilno stvrdnjavanje ili spajanje adheziva GC Ortho Connect.
6. Ne mešati sa drugim sličnim proizvodima.
7. Nastavci za doziranje se ne mogu sterilisati u autoklavu ili hemiklavu.
8. Ne brisati nastavak za doziranje sa puno alkohola, jer se time može kontaminirati materijal.
9. Nositi plastične ili gumene rukavice tokom rada kako bi se izbegao direktan dodir sa smolastim slojevima inhibicije polimerizacije kiseonikom i time sprečila moguća preosetljivost.
10. Nositi zaštitne naočare tokom svetlosne polimerizacije.
11. Pri poliranju polimerizovanog materijala koristiti sakupljač prašine i nositi masku za zaštitu od prašine kako bi se izbeglo udisanje prašine od brušenja.
12. Izbegavati dodir materijala sa odećom.
13. Otpad zbrinuti u skladu sa lokalnim propisima.
14. U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osetljivost kod nekih osoba. U slučaju pojave takve reakcije, prekinuti upotrebu proizvoda i potražiti lekara.
15. Uvek nositi ličnа zaštitna sredstva (Personal Protective Equipment - PPE), kao što su rukavice, maske za lice i zaštitne naočare.

Neki proizvodi navedeni u ovim uputstvima mogu biti svrstani u opasne u skladu sa Globalno usklađenom sistemu razvrstavanja i označavanja hemikalija (GHS - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals). Uvek je potrebno upoznati se sa sigurnosno-tehničkim listovima materijala dostupnim na:
www.gc.dental/ortho
Mogu se nabaviti i od dobavljača.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA:
SISTEM ZA VIŠEKRATNO DOZIRANJE: za izbegavanje međusobne kontaminacije između pacijenata, ovaj uređaj zahteva srednji nivo dezinfekcije. Odmah nakon upotrebe proveriti uređaj i označiti ga ako su mu svojstva umanjena. U slučaju oštećenja uređaj baciti.
NE URANJATI U VODU. Uređaj detaljno očistiti kako bi se sprečilo sušenje i nakupljanje ostataka materijala. Dezinfikovati ga registrovanim sredstvom za srednji nivo kontrole infekcije u zdravstvu u skladu sa regionalnim / nacionalnim propisima.

Za rezime sigurnosti i kliničkog učinka (Summary of Safety and Clinical Performance - SSCP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gce@gc.dental

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima:
Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajući sistem nadzora, odabirom odgovarajuće autoriteta u vašoj državi, dostupno putem sledeće veze:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
kao i na naš interni sistem nadzora: vigilance@gc.dental
Na taj način doprinećete poboljšanju sigurnosti ovog proizvoda.

Datum zadnje revizije: 08/2024

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання. UK

GC Ortho Connect™ ДжіСі Орто Конект

ОРТОДОНТИЧНИЙ АДГЕЗИВ СВІТЛОВОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

ПОКАЗАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
1. Бондинг металевих брекетів та пластин
2. Бондинг керамічних брекетів
3. Бондинг пластикових брекетів та акрилових конструкцій

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
1. Уникайте використання продукту для пацієнтів із підтвердженою алергією на мономер та полімери метакрилату.
2. Фіксація металевих ортодонтичних конструкцій на ортопедичних коронках (зокрема, Апарат Хербста).

СКЛАД
Диметакрилат, діоксид кремнію, барієве скло, ефірний мономер фосфорної кислоти, ініціатор, пігмент, стабілізатор

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
А. ПІДГОТОВКА ЗУБА
   1. Очистіть адгезивну поверхню зуба за допомогою пемзи та води. Ретельно промийте водою. Просушіть слабким струменем повітря без домішків масел.
   2. Протравіть поверхню зуба за допомогою GC Ortho Etching Gel (ДжіСі Орто Етчінг Гель) (37% розчин фосфорної кислоти) протягом 30 сек. Ретельно промийте водою. Зверніться до відповідних інструкцій із застосування.
   3. Видаліть надлишки вологи за допомогою повітря без домішок масел. Відпрепарована поверхня має бути сухою.
   ПРИМІТКА:
   Якщо адгезивна поверхня містить кераміку, композит, цирконій або метал, її слід обробити відповідним чином. Кераміка та композит повинні бути оброблені піскоструминним способом і попередньо оброблені силаном. Цирконій і метал повинні бути оброблені піскоструминним способом. Зверніться до інструкцій виробника.
Б. ПІДГОТОВКА БРЕКЕТА
Переконайтеся, що брекет попередньо оброблено та підготовлено відповідно до інструкцій виробника.
С. ПІДГОТОВКА ШПРИЦА
   1. Тримайте шприц вертикально та зніміть ковпачок, повернувши його проти годинникової стрілки.
   2. Швидко та надійно прикріпіть дозувальний наконечник до шприца, повернувши його за годинниковою стрілкою.
   3. Встановіть світлозахисну кришку до використання.
   ПРИМІТКА:
   Будьте обережні, щоб не прикріпити дозувальну насадку надто туго.
   Це може пошкодити його гвинт. Щоб забезпечити щільне з'єднання, переконайтеся, що різьба вільна від залишків матеріалу.

D. ПРОЦЕДУРА БОНДИНГУ
Брекети
   1. Зніміть захисний ковпачок з дозувальної насадки.
   ПРИМІТКА:
   Перш ніж використовувати шприц, переконайтеся, що дозувальна насадка надійно прикріплена до шприца. Будь-які можливі залишки повітря з насадки видаляються, обережно штовхаючи вперед поршень шприца кінчиком доріжки, поки матеріал не досягне отвору наконечника.
   2. Повільно натисніть на поршень, щоб вичавити матеріал. Якщо насадка забилася, зніміть її на та видавіть невеликий матеріал безпосередньо зі шприца.
   3. Повністю покрийте адгезивну поверхню брекета пастою.
   4. Позиціонуйте покритий брекет на зубі.
   5. Міцно притисніть брекет до поверхні емалі. За допомогою зонда або скалера видаліть надлишки адгезиву. Знову натисніть на брекет. Продовжуйте розміщувати додаткові брекети. Розташуйте всі брекети у квадранті або в повній дузі.
   ПРИМІТКА:
   a. Після видалення надлишків адгезиву будьте обережні, щоб не зрушити брекети до того, як адгезив затвердіє. Переміщення дуг у цій точці може знизити міцність з'єднання.
   b. Зведіть до мінімуму вплив зовнішнього світла. Навколишнє освітлення може скоротити час маніпуляції.
   6. Полімеризуйте кожен брекет протягом 10 секунд з мезіального та дистального боку за допомогою світлодіодного полімеризуючого пристрою (>500 мВт/см², 460-480 нм).
   ПРИМІТКА:
   a. Дуже важливо періодично перевіряти полімеризаційну лампу за допомогою люксметра, щоб забезпечити достатню потужність світла.
   b. Тримайте світловод якомога ближче до адгезиву та брекетів.

Акрилові конструкції
   1. За допомогою мікропротравлювання або ротаційного інструменту надайте шорсткість і розмістіть отвори для утримання на внутрішніх поверхнях пристрою.
   2. Підготуйте зуб, як зазначено в частині 1.
   3. Щоб полегшити видалення пристрою, помістіть вазелін на оклюзійні поверхні зубів.
   4. Заповніть внутрішні поверхні конструкції GC Ortho Connect (ДжіСі Орто Конект).
   5. Встановіть конструкцію у відповідне положення.
   6. Негайно видаліть надлишок адгезиву з периферії конструкції.
   7. Полімеризуйте світлом щічну, піднебінну та оклюзійну поверхні протягом 10 секунд кожну за допомогою світлодіодного полімеризатора (>500 мВт/см², 460-480 нм).
   8. Активацію прилади можна розпочати під час сну пацієнта того ж вечора.
Е. ПРОЦЕДУРА ДЕБОНДИНГУ
Брекети
Візьміться за брекет лігатурною фрезою і, підтримуючи зуб пальцями з язичного боку, різко обертайте брекет за годинниковою стрілкою. Якщо виникне опір, спробуйте знову скрутити в протилежному напрямку. Видаліть залишки адгезиву обертовим інструментом.

Акрилові конструкції
Щоб зняти закріплені конструкції, зігніть прилад у кількох місцях за допомогою плоскогубців для зняття скоб. Якщо це не вийде, розріжте прилад і вийміть.

ВІДТІНОК
ПРОЗОРИЙ

ЗБЕРІГАННЯ
Для оптимальної роботи рекомендується зберігати при кімнатній температурі (4–25°C / 39,2–77,0°F) далі від прямих сонячних променів.

ПАКОВАННЯ
2 x 2,9 г (2,0 мл) шприц
4 x дозувальних насадки для GC Ortho Connect (ДжіСі Орто Конект)
2 x світлозахисних кришки

УВАГА
   1. У разі контакту з ротовою порожниною або шкірою негайно видаліть їх ватою або губкою, змоченою в спирті. Промити водою. Щоб уникнути контакту, можна використовувати кофердам і/або COCOA BUTTER для ізоляції операційного поля від шкіри або тканин ротової порожнини.
   2. У разі потрапляння в очі негайно промийте водою та зверніться до лікаря.
   3. Будьте обережні, щоб уникнути проковтування матеріалу.
   4. У разі контакту з небажаними ділянками зуба або протезів видаліть інструментом, губкою або ватним диском перед полімеризацією світлом.
   5. Не використовуйте GC Ortho Connect (ДжіСі Орто Конект) у поєднанні з матеріалами, що містять евгенол, оскільки евгенол може завадити GC Ortho Connect (ДжіСі Орто Конект) належному схопленню або з'єднанню.
   6. Не змішуйте з іншими схожими продуктами.
   7. Дозув